

## PLICATUOPSIS CRISPA

**Nom de référence** : *Plicatuopsis crispa* (Pers.) D.A Reid

**Synonymes** : *Plicatura crispa* (Pers.) Rea  
*Trogia crispa* (Pers.) Fr.

**Classification** : **Division** : Basidiomycota  
**Ordre** : Agaricales  
**Famille** : Amylocorticiaceae

**Nom français** : plicature crispée.

**Intérêt culinaire** : aucun.



## **1-DESCRIPTION**

**1-1 Silhouette** : en groupe, champignons superposés ou accolés sur bois, chacun de petite taille. Couleur dominante : gris-jaunâtre à orange ochracé.

**1-2 Chapeau ou réceptacle** : un chapeau mesure de 1 à 3 cm, il est semi-circulaire, en forme d'éventail. Le revêtement est feutré et zoné, il est brun-grisâtre, orangé à fauve ochracé. La marge est blanche, enroulée, flexueuse, ondulée parfois lobée.

**1-3 Pied ou stipe** : en règle générale ce champignon n'a pas de pied distinct, il peut cependant exister mais il est alors rudimentaire, court, excentré et dans le prolongement du chapeau.

**1-4 Chair** : mince, molle puis devenant coriace voire élastique, elle est de couleur blanchâtre. Son odeur est faible, sa saveur est douce,

**1-5 Lames, plis, pores** : l'hyménium n'est pas constitué de lames, il prend la forme de rides ou de plis arrondis. En fait, ce sont de pores sublamellés, de couleur blanchâtre à gris olivâtre, peu profonds, interveinés-anastomosés et crispés. Ils rayonnent à partir du point d'attache. L'arête des veines est denticulée.

**1-6 Sporée** : blanche.

**1-7 Habitat** : sur bois mort de feuillus, surtout de hêtres et de noisetiers du printemps jusqu'au début de l'hiver.

**1-8 Répartition** : commun, surtout en montagne mais il n'est pas très rare en plaine.

## **2-OBSERVATIONS**

### **3-INTERÊT**

Non comestible.

### **4-RISQUES DE CONFUSION**

Aucun, même si *Meruliopsis corium* et *Merulius papyrinus* lui ressemblent par les couleurs, ces dernières espèces poussent en guirlandes sur la face inférieure des branches et n'ont pas les pores lamellés de façon radiale.

**Vérfifié le 10 octobre 2013**