

## LACTARIUS ACERRIMUS

**Nom de référence** : *Lactarius acerrimus* Britz.

**Synonymes** : *Lactarius insulsus* ss. auct.  
*Lactifluus acerrimus* (Britz.)Kuntzle

**Classification** : **Division** : Basidiomycota

**Ordre** : Russulales

**Famille** : Russulaceae

**Nom français** : lactaire très âcre.

**Intérêt culinaire** : immangeable.



## **1-DESCRIPTION**

- 1-1 Silhouette** : au sol, de dimension moyenne avec un pied central surmonté d'un chapeau légèrement convexe puis déprimé. Couleur dominante : jaune-ochracé à beige.
- 1-2 Chapeau** : entre 5 et 12 cm de diamètre, il est de couleur crème-jaunâtre-ochracé mais plus pâle à blanchâtre vers la marge. Il est convexe à l'état jeune, il s'aplanit ensuite pour se creuser en entonnoir. Il est souvent de forme irrégulière. Le revêtement est peu séparable, en surface il est mat et velouté puis glabre et parfois discrètement zoné en périphérie. Par temps humide il est poisseux. La marge est fine, lisse ou pruinée ou même feutrée, elle est enroulée puis ondulée avec l'âge.
- 1-3 Pied ou stipe** : de 2-5 x 0,8-5 cm, il est court, cylindrique, plus ou moins tordu et atténué vers la base, il est d'abord plein puis fistuleux avec l'âge. Sa surface est de couleur blanchâtre, dans la jeunesse elle est pruinée au sommet. Elle est parfois scrobiculée ou tachetée de brun, elle se teinte d'ochracé-rosâtre en vieillissant.
- 1-4 Chair** : elle est blanche et le reste à la coupe. Le lait est également blanc et immuable, il a une saveur brûlante, piquante alors que l'odeur de pomme est agréable.
- 1-5 Lames** : assez espacées, largement adnées à subdécurrentes à l'insertion sur le pied, elles sont nettement fourchues et interveinées/crispées (anastomosées) près du pied. Elles sont d'abord blanchâtres mais deviennent vite rose-ochracé. Présence de lamelles et lamellules. L'arête des lames est aigüe et concolore aux faces mais elle roussit avec l'âge.
- 1-6 Sporée** : crème.
- 1-7 Habitat** : de juin à septembre, sous feuillus, dans les parcs avec une préférence pour les chênaies sur les sols alcalins.
- 1-8 Répartition** : espèce assez commune surtout en moyenne montagne.

## **2-OBSERVATIONS**

Les lames roses et irrégulières près du pied sont des caractères permettant de distinguer le lactaire très âcre de ses sosies.

## **3-INTERÊT**

Aucun, saveur bien trop âcre.

## **4-RISQUES DE CONFUSION**

On le peut confondre avec le *Lactarius evosmus* qui sent aussi la pomme et dont le lait est également âcre, mais les lames de ce dernier ne sont ni fourchues ni interveinées/crispées à proximité du pied.

Un autre sosie, le *Lactarius zonarius* possède un chapeau nettement feutré près de la marge.

**MAJ MJ 22 juillet 2013**