

LACTARIUS DECIPIENS

Nom de référence : *Lactarius decipiens* Quélet

Synonymes : *Lactarius rufus* var. *decipiens* (Quélet) Kuntze
Lactarius theiogalus var. *decipiens* (Quélet) Maire

Classification : Division : Basidiomycota

Ordre : Russulales

Famille : Russulaceae

Nom français : lactaire trompeur.

Intérêt culinaire : aucun.



1-DESCRIPTION

- 1-1 Silhouette** : au sol, de dimension moyenne avec un pied central surmonté d'un chapeau convexe puis un peu déprimé. Couleur dominante : rose-ochracé.
- 1-2 Chapeau** : de 3 à 6/7 cm. Convexe puis aplani et ensuite un peu déprimé, il a souvent un petit mamelon central qui disparaît plus tard. Le revêtement est un peu humide, à peine hygrophane, sensiblement givré, pruineux (loupe) dans la jeunesse puis lisse et non zoné. Il est de couleur ocre-rougeâtre pâle à beige-rose, le centre étant plus foncé. La marge est fine, enroulée, régulière ou légèrement ondulée, elle est striée ou crénelée dans la jeunesse seulement.
- 1-3 Pied ou stipe** : de 3-7 x 0,5-1 cm. Il est central, cylindrique mais un peu atténué en bas, plein puis creux, peu régulier, bosselé ou comprimé, sa base est atténuée. La surface est concolore au chapeau ou plus pâle, tout en haut du pied elle est pâle alors que tout en bas elle est de couleur brun-rougeâtre et peut montrer un feutrage blanc.
- 1-4 Chair** : assez peu épaisse, molle, souple. Elle est crème, à peine teintée de rose sauf dans la moitié inférieure du pied où elle est roussâtre. La chair jaunit après la coupe, sa saveur est âcre et devient amère, son odeur de pélargonium (géranium) est nette. Le Lait est peu abondant, il est séreux, blanchâtre mais jaunit rapidement sur un mouchoir et même sur la chair du champignon lors de la cassure, sa saveur âcre et amère.
- 1-5 Lames** : elles sont assez serrées, minces, largement adnées à subdécurrentes et rarement fourchues à proximité du pied. Les lames sont blanchâtres puis crème-incarnat, elles se tachent de rouille en vieillissant. Lamelles et lamellules présentes. L'arête est entière, aiguë et concolore aux lames.
- 1-6 Sporée** : blanchâtre, blanc-crème.
- 1-7 Habitat** : dans les bois de feuillus, surtout de charmes et de chênes, cette espèce est moins fréquente sous les résineux. De juin à novembre.
- 1-8 Répartition** : espèce assez fréquente en plaine, plus rare en haute montagne. Elle vient en petit groupe, mais parfois isolément.

2-OBSERVATIONS

Les lactaires à lait blanc ne sont pas comestibles.

3-INTERÊT

Ce lactaire n'est pas comestible.

4-RISQUES DE CONFUSION

Ils ne sont pas rares pour qui n'est pas attentif au jaunissement du lait et à la nette odeur de pélargonium de cette espèce.

MAJ MJ 24 juillet 2013