

CLAVULINA RUGOSA

Nom de référence : *Clavulina rugosa* (Bulliard) Schröter

Synonymes : *Ramaria rugosa* (Bull.) Quéél.

Ramaria rugosa (Bull.) Gray

Classification : **Division** : Basidiomycota

Ordre : Agaricales

Famille : Clavariaceae

Nom français : clavaire rugueuse.

Intérêt culinaire : aucun.



1-DESCRIPTION

1-1 Silhouette : au sol et en groupe, de dimension faible à moyenne, elle est en forme de massue fine, irrégulière, peu ou pas ramifiée. Couleur dominante : blanchâtre.

1-2 Chapeau/réceptacle : il ne possède pas chapeau au sens traditionnel du terme. Le champignon a l'allure d'une massue étroite. Il se présente sous la forme d'une colonne dressée et rétrécie de haut en bas. Sa hauteur est de 5 à 10 cm et sa largeur de 0,5 à 2 cm. Cette colonne est irrégulière, torsadée, bosselée et même parfois difforme. Son sommet est aplati, obtus, parfois il montre l'amorce de ramifications rudimentaires. La surface est ridée à plissée, elle est blanchâtre mais ochracée tout en bas.

1-3 Pied ou stipe : il est indistinct.

1-4 Chair : elle est blanche, cassante. L'odeur est faible, la saveur est douce.

1-5 Lames, tubes et pores, aiguillons : ce champignon n'en possède pas.

1-6 Sporée : blanche.

1-7 Habitat : sous bois de feuillus et de conifères. D'août à fin novembre.

1-8 Répartition : large, espèce commune.

2-OBSERVATIONS

Cette espèce présente des formes très variables qui rendent son identification délicate.

3-INTERÊT

Aucun.

4-RISQUES DE CONFUSION

Avec les autres clavaires blanchâtres dont *Clavulina cinerea*, *Clavulina tenuipes*, *Clavulina coralloides*, *Clavaria falcata*.

MAJ MJ 21 juillet 2013