

## XYLARIA HYPOXYLON

**Nom de référence** : *Xylaria hypoxylon* (L.) Grev.

**Synonymes** : *Sphaeria hypoxylon* (L.) Pers.  
*Clavaria hypoxylon* L. : Fr.

**Classification** : **Division** : Ascomycota  
**Ordre** : Xylariales  
**Famille** : Xylariaceae

**Nom français** : xylaire du bois.

**Intérêt culinaire** : aucun.



Photo : Patrice Canal

## **1-DESCRIPTION**

**1-1 Silhouette** : en groupe sur bois, de faible dimension, en forme d'arbuscule dressé et souvent ramifié en haut. Couleur dominante : noire à la base, blanche au sommet.

**1-2 Fructification/réceptacle** : ce champignon mesure de 3 à 4 cm de haut, il est en forme d'un bois de cerf aplati, son sommet présente généralement de petites ramifications pointues. Ce champignon ne possède ni chapeau abritant des lames, des plis, des tubes et pores, ou des aiguillons. Il ne possède pas non plus de pied distinct. Le sommet ramifié est blanchi par les spores asexuées, la base est noire et feutrée.

**1-3 Lames, tubes et pores, aiguillons** : inexistant.

**1-4 Chair** : tenace, coriace, elle a la consistance du liège ou du bois. Elle est blanche.

**1-5 Pied ou stipe** : inexistant ou très court et peu distinct car il se situe dans le prolongement du réceptacle donc sans transition nette.

**1-6 Sporée** : noire.

**1-7 Habitat** : en groupe de nombreux sujets sur les souches et les branches mortes de feuillus. Toute l'année.

**1-8 Répartition** : champignon très fréquent partout en France.

## **2-OBSERVATIONS**

Les *Xylaria* ressemblent aux *Clavaria*, *Ramaria*, mais ces dernières n'ont pas la consistance coriace des *Xylaria* et n'ont pas la même couleur noirâtre. Les *Clavaria*, *Ramaria* et proches appartiennent à la division des *Basidiomycota*.

## **3-INTERÊT**

Non comestible.

## **4-RISQUES DE CONFUSION**

*Xylaria polymorpha*, *Xylaria longipes*, *Xylaria filiformis*, *Xylaria carpophila*.

**MAJ MJ septembre 2013**