

## LACTARIUS HEPATICUS

**Nom de référence** : *Lactarius hepaticus* Plowright

**Synonymes** : Aucun

**Classification** : **Division** : Basidiomycota

**Ordre** : Russulales

**Famille** : Russulaceae

**Nom français** : lactaire couleur de foie, lactaire hépatique.

**Intérêt culinaire** : aucun.



## **1-DESCRIPTION**

- 1-1 Silhouette** : au sol, de dimension plutôt moyenne avec un pied central surmonté d'un chapeau légèrement convexe puis peu déprimé. Couleur dominante : brun-rouge sombre.
- 1-2 Chapeau** : de 3 à 6 cm. A peine convexe puis aplani et ensuite un peu déprimé, il a parfois un mamelon central. Le revêtement est un peu gras (test du baiser), lisse ou légèrement ridé, brillant, non zoné, il est couleur brun-rouge sombre marqué de reflets olivâtres (couleur de foie). La couleur pâlit au sec. La marge est fine, enroulée, brièvement striée à cannelée, elle est un peu pruineuse de blanc et donc plus pâle.
- 1-3 Pied ou stipe** : de 3-6 x 0,5-1 cm. Il est assez élancé, central, cylindrique ou épaissi à la base qui est parfois coudée. Il est plein, rarement creux. Sa surface est un peu plus pâle que celle du revêtement du chapeau surtout à son sommet qui reste marqué de fines stries dues aux lames (loupe). La base du pied est plus foncée, rouge-vineux, l'extrême base est à peine feutrée.
- 1-4 Chair** : assez peu épaisse, tendre, elle est crème-carné pâle mais plus foncée en bas du pied. Elle se teinte par endroits de jaune après la coupe. Sa saveur est âcre et amère, l'odeur est faible. Le lait est peu abondant sauf chez les jeunes exemplaires, il est blanc, en séchant il jaunit lentement sur les lames mais il jaunit rapidement sur un mouchoir. Le lait est de saveur âcre, amarescent.
- 1-5 Lames** : elles sont assez serrées, minces, largement adnées à subdécurrentes, rarement fourchues à proximité du pied. Les lamelles et lamellules sont présentes. Les lames sont crème puis teintée de rosâtre, elles se tachent de roux en vieillissant. L'arête est entière, aiguë et concolore aux faces.
- 1-6 Sporée** : blanchâtre, blanc-crème.
- 1-7 Habitat** : dans les bois mêlés, surtout dans les bois de pins de préférence sur sol acide. De septembre au début de l'hiver.
- 1-8 Répartition** : espèce fréquente en plaine et en moyenne montagne. Elle vient généralement en petits groupes.

## **2-OBSERVATIONS**

Les lactaires à lait blanc ne sont pas comestibles.

## **3-INTERÊT**

Ce lactaire n'est pas comestible. Les lactaires à lait blanc doivent être rejetés.

## **4-RISQUES DE CONFUSION**

Ces risques existent avec tous les lactaires de couleur brun-rougeâtre à lait blanc, jaunissant et de saveur âcre, amère (*Lactarius badiosanguineus* par exemple).

**MAJ MJ 24 juillet 2013**