

LACTARIUS QUIETICOLOR

Nom de référence : *Lactarius quieticolor* Romagn.

Synonymes : *Lactarius hemicyaneus* Romagn.

Lactarius deliciosus var. *hemicyaneus* (Romagn.) Krieglst.

Classification : **Division** : Basidiomycota

Ordre : Russulales

Famille : Russulaceae

Nom français : lactaire orangé gris, lactaire à couleur de quietus.

Intérêt culinaire : comestible sans intérêt.



Photo Wikimedia

1-DESCRIPTION

- 1-1 Silhouette** : au sol, de dimension moyenne avec un pied central surmonté d'un chapeau légèrement convexe puis peu déprimé. Couleur dominante : orangé sombre à gris-bleuâtre.
- 1-2 Chapeau** : de 2,5 à 6/7 cm, il est convexe puis déprimé au centre avec l'âge. Le revêtement peu séparable, est lisse, terne, givré, sec bien que lubrifié à légèrement visqueux dans la jeunesse ou par temps humide, il est de couleur orangé sombre marqué de points gris-bleu à brun-violet qui forment des zones concentriques qui peuvent lui donner un aspect bleu-grisâtre. La marge est ondulée, fortement enroulée à l'état jeune, lisse et marquée de pruine blanchâtre (loupe).
- 1-3 Pied ou stipe** : de 2,5-5,5 x 1-2 cm, il est trapu, légèrement ventru, vite creux. Sa surface est orangée, givrée de blanc, tachée d'orange et marquée de verdâtre plus tard, elle est rarement marquée de scrobicules. Tout en haut, il est normalement cerné de blanc, juste sous les lames.
- 1-4 Chair** : épaisse, ferme, cassante, jaunâtre à la coupe puis orange vif par le lait, elle évolue après la coupe vers le vineux puis se tache lentement de verdâtre. La chair est bleutée sous le revêtement du chapeau. Le lait est orangé vif, il devient brun vineux puis verdâtre. La saveur est amarescente, l'odeur est légèrement fruitée.
- 1-5 Lames** : adnées à subdécurrentes à l'insertion sur le pied, elles sont serrées, peu fourchues, de couleur orange clair mais elles deviennent plus sombres avec l'âge et se tachent de verdâtre. Les lamelles et lamellules sont nombreuses. L'arête est lisse, aiguë, plus pâle que la face des lames.
- 1-6 Sporée** : ochracée.
- 1-7 Habitat** : sous les pins, plutôt sur sol acide ou sablonneux, en plaine et en montagne. Cette espèce préfère les sols humides et acides.
- 1-7 Répartition** : isolés à grégaires. On rencontre occasionnellement cette espèce de l'été au début de l'hiver.

2-OBSERVATIONS

Espèce peu commune.

Les lactaires à lait rouge ne sont pas toxiques, tous sont comestibles mais certains sont de bien faible qualité gustative.

3-INTERÊT

Comestible médiocre.

4-RISQUES DE CONFUSION

Il existe la variété *hemicyaneus* dont la chair devient bleuâtre sous le revêtement à la coupe et la forme *semisanguinascens* à lait plus rouge. On peut aussi le confondre avec le *Lactarius deliciosus*, au lait orange changeant peu de couleur et qui vient aussi sous pins sur sol alcalin.

Vérfifié le 12 décembre 2013