

LACTARIUS QUIETUS

Nom de référence : *Lactarius quietus* (Fr.) Fr.

Synonymes : *Agaricus quietus* Fr.
Lactifluus quietus (Fr.) Kuntze

Classification : **Division** : Basidiomycota
Ordre : Russulales
Famille : Russulaceae

Nom français : lactaire à odeur de punaise, lactaire tranquille, lactaire modeste.

Intérêt culinaire : sans intérêt ou très médiocre comestible.



Photo : Michel Javayon

1-DESCRIPTION

- 1-1 Silhouette** : au sol, de dimension moyenne avec un pied central surmonté d'un chapeau légèrement convexe-plan puis déprimé. Couleur dominante : brun-roussâtre ou beige.
- 1-2 Chapeau** : de 2 à 9 cm, il est convexe à plan, non mamelonné puis déprimé avec l'âge. Le revêtement séparable sur 2/3 du rayon, de couleur brun-roussâtre, il est givré-micacé, sec et mat, légèrement zoné, et peut présenter quelques taches (guttules) plus sombres. En séchant et par temps sec le revêtement devient beige-rosâtre. La marge, enroulée à l'état jeune est courtement cannelée, elle pâlit à maturité.
- 1-3 Pied ou stipe** : de 2-7 x 0,5-2 cm, cylindrique, fusiforme ou amoindri de haut en bas, il est plein mais se creuse avec l'âge, il est souvent courbé. Sa surface est concolore à celle du chapeau sauf en bas où elle est brun-vineux, elle est finement poudrée (loupe). En haut, elle est sillonnée par des marques laissées par les lames décurrentes.
- 1-4 Chair** : elle est blanchâtre sauf à la base du pied où elle est brun-pourpre ; rougit au contact de l'air dans le chapeau. L'odeur de punaise est fort désagréable et encore plus chez le champignon sec, la saveur est douce mais un peu astringente. Le lait est copieux, blanc, immuable, de saveur douce puis légèrement âcre et amère.
- 1-5 Lames** : adnées à décurrentes à l'insertion sur le pied, elles sont serrées. Lamelles et lamellules présentes. Certaines sont fourchues près du pied. Elles sont de couleur blanchâtre puis brun-rose. L'arête est lisse, entière et concolore aux faces.
- 1-6 Sporée** : crème, rosé pâle.
- 1-7 Habitat** : dans les forêts de feuillus mêlés, exclusivement sous chênes et de préférence sur sols alcalins ou acides.
- 1-8 Répartition** : espèce grégaire, fréquente en été et automne en plaine et en montagne.

2-OBSERVATIONS

Espèce facile à reconnaître : assez robuste, de couleur brun rouge pâissant, revêtement un peu zoné et givré/micacé (comme marqué par la bave d'escargot), odeur désagréable de punaise et inféodée au chêne.

Sporée : Javayon M.

3-INTERÊT CULINAIRE

Aucun.

4-RISQUES DE CONFUSION

On peut confondre cette espèce avec le *Lactarius serifulus* dont le chapeau n'est pas zoné.

Vérfié le 28 novembre 2013

