

LACTARIUS SUBDULCIS

Nom de référence : *Lactarius subdulcis* (Pers.) Gray

Synonymes : *Lactifluus subdulcis* (Pers.) Kuntze
Agaricus lactifluus var. *subdulcis* Pers.

Classification : **Division** : Basidiomycota

Ordre : Russulales

Famille : Russulaceae

Nom français : lactaire presque doux, lactaire caoutchouc.

Intérêt culinaire : aucun.



1-DESCRIPTION

- 1-1 Silhouette** : au sol, de dimension plutôt faible à moyenne avec un pied central surmonté d'un chapeau légèrement convexe puis peu déprimé. Couleur dominante : brun-roux.
- 1-2 Chapeau** : de 3 à 6 cm. Sensiblement convexe puis aplani et finalement un peu déprimé, il garde très souvent un mamelon central pointu. Le revêtement est sec, mat, un peu rugueux, non zoné mais ridé, froissé ou chiffonné autour du mamelon et finement feutré (loupe) ailleurs. Sa couleur est beige-brunâtre, brun-roux à roux-orangé. Le revêtement est séparable de la chair du chapeau sur 1/3 du rayon. La marge est enroulée au début, puis ondulée, fine et pruinuse (loupe), elle est plus pâle que le chapeau.
- 1-3 Pied ou stipe** : de 3-6 x 0,5-1,5 cm. Il est central, cylindrique, courbé et atténué dans la moitié inférieure. Il est plein puis farci et se creuse à la fin. La surface est plus ou moins ridée ou lisse, elle est rouge-orangé clair ou parfois brun-rougeâtre sauf tout en haut où elle est pâle. La base est couverte d'un fin feutrage blanc.
- 1-4 Chair** : peu épaisse, sauf au centre du chapeau, elle est blanc-crème et se teinte un peu de roussâtre après la coupe. Sa saveur est tout d'abord douce puis devient piquante-amarscente après mastication, l'odeur de caoutchouc (ou même de punaise) est désagréable. Le lait est assez abondant mais vite tari. Il est douceâtre puis un peu amer, il est blanc et immuable.
- 1-5 Lames** : elles sont assez serrées, minces, largement adnées à décurrentes, quelques unes sont fourchues à proximité du pied. Lamelles et lamellules présentes. Les lames sont blanchâtres à crème puis teintées de rosâtre à ocre-orangé et se tachent de brun. L'arête est aiguë, entière, concolore aux faces des lames mais elle roussit dans les blessures.
- 1-6 Sporée** : ocre.
- 1-7 Habitat** : dans les bois de feuillus (hêtres et charmes surtout), rare sous les résineux. Il préfère les sols légèrement acides. De juillet à novembre.
- 1-8 Répartition** : espèce assez fréquente en plaine et en montagne. Elle vient en petits groupes, les pieds étant parfois soudés entre eux.

2-OBSERVATIONS

Les lactaires à lait blanc ne sont pas comestibles.

3-INTERÊT

Ce lactaire n'est pas comestible.

4-RISQUES DE CONFUSION

Ils sont rares pour qui est attentif au lait blanc immuable, à la couleur du chapeau, au mamelon aigu généralement présent et à la couleur plus claire en haut du pied.

Vérifié le 16 mai 2013

MAJ MJ le 5 août 2013