

LACTARIUS TABIDUS

Nom de référence : *Lactarius tabidus* Fr.

Synonymes : *Lactarius subdulcis* var. *tabidus* (Fr.) Quél.
Lactarius mutissimus var. *tabidus* (Fr.) Quél.

Division : Basidiomycota

Ordre : Russulales

Famille : Russulaceae

Nom français : lactaire chiffonné, lactaire dépérissant, lactaire liquéfié.

Intérêt culinaire : aucun.



Photo : Annette Jacquet

1-DESCRIPTION

- 1-1 Silhouette** : au sol, de dimension plutôt faible avec un pied central surmonté d'un chapeau légèrement convexe puis à peine creusé Couleur dominante : ocre orangé clair.
- 1-2 Chapeau** : de 2 à 5 cm. Un peu convexe puis aplani et finalement un peu déprimé, il possède un petit mamelon central. Le revêtement est sec, mat, terne, rugueux, un peu ridulé, comme froissé ou chiffonné autour du mamelon central, il n'est pas zoné. Le revêtement est lisse, sec, de couleur ocre orangé clair à brun orangé, il est plus foncé au disque. La marge est enroulée au début, puis un peu crispée-ridée, ondulée, fine, légèrement striée ou non, translucide et pruineuse, elle est sensiblement plus pâle que le reste du revêtement du chapeau.
- 1-3 Pied ou stipe** : de 2-7 x 0,3-0,8 cm. Il est central, cylindrique ou clavé bien qu'un peu évasé sous les lames. Il est plein puis farci et se creuse à la fin. La surface est sensiblement plus claire que le revêtement du chapeau, elle est encore plus pâle en haut mais plus rougeâtre en bas. Elle est pruineuse chez le jeune champignon, elle est un peu ridulée longitudinalement ensuite. L'extrême base peut être feutrée.
- 1-4 Chair** : mince et fragile, elle est crème-brun pâle à ocre rose dans le chapeau et jaunit à peine après la coupe, mais elle est de couleur roussâtre dans le cortex du pied. Sa saveur est amarescente, l'odeur est faible ou fruitée. Le lait assez abondant, blanc aqueux, jaunit lentement à la coupe mais plus rapidement (20 à 30 secondes) sur un mouchoir. Le lait est de saveur douce au début puis un peu amarescente et acescente.
- 1-5 Lames** : largement adnées à subdécurrentes à l'insertion sur le pied, elles sont assez peu serrées, minces, fourchues à proximité du pied certaines le sont aussi près de la marge. Les lames sont de couleur beige crème teinté de rose, parfois elles se tachent de rouille. Les lamelles et lamellules sont présentes. L'arête est aiguë, entière, concolore à la face des lames ou un peu plus pâle.
- 1-6 Sporée** : blanchâtre à crème un peu teintée de rose.
- 1-7 Habitat** : surtout dans les bois de feuillus (bouleaux surtout), mais aussi sous résineux. De préférence dans les stations humides (tourbières, sphaignes). De juillet à novembre.
- 1-8 Répartition** : espèce assez fréquente en plaine et en montagne. Elle vient isolément ou en petit groupe.

2-OBSERVATIONS

Les lactaires à lait blanc ne sont pas comestibles.
Certains auteurs donnent *Lactarius theiogalus* comme synonyme de *Lactarius tabidus*.

3-INTERÊT

Ce lactaire n'est pas comestible.

4-RISQUES DE CONFUSION

Il faut bien observer les caractères essentiels (taille, couleur, consistance...) et identifier le biotope pour éviter les confusions.

Vérfifié le 8 janvier 2014