

LECCINUM AURANTIACUM

Nom de référence : *Leccinum aurantiacum* (Bull.) Gray

Synonymes : *Leccinum rufum* (Schaeff.) Kreisel
Krombholziella aurantiaca (Bull.) Maire

Classification : **Division** : Basidiomycota

Ordre : Boletales

Famille : Boletaceae

Nom français : bolet orangé, bolet orangé des chênes.

Intérêt culinaire : assez bon comestible.



1-DESCRIPTION

1-1 Silhouette : au sol, de dimension moyenne à grande avec un pied central surmonté d'un chapeau convexe. Couleur dominante : brun-orangé.

1-2 Chapeau : de 4 à 15 (25) cm. Il est globuleux puis convexe à étalé. Le revêtement, de couleur roux-orangé à brun-roux, est à peine visqueux par temps humide, sinon il est mat, feutré, velouté. Sur les exemplaires jeunes la marge se prolonge par une membrane rabattue sur les pores. Cette membrane disparaît plus tard, la marge est alors fine et pendante.

1-3 Pied ou stipe : de 5-20 x 2-5 cm, il est cylindrique ou renflé au milieu. Le pied est plein, ferme et râpeux, en effet sa surface blanchâtre porte des aspérités rugueuses à écailleuses qui au début sont blanches en haut du pied où elles sont alignées en fines côtes longitudinales. Plus bas ces aspérités sont brun-roux. Avec l'âge toutes les aspérités virent au brun sombre à partir de la base du pied.

1-4 Chair : épaisse et ferme. Dans le chapeau elle est blanchâtre puis elle vire lentement au gris-violet sombre et enfin au noirâtre après la coupe. Il en est de même de la chair du pied. Cependant la surface du pied peut présenter des tons vert-bleuté à la base. La saveur est douce, l'odeur est douce et agréable.

1-5 Tubes et pores : les tubes sont facilement séparables de la chair du chapeau. Adnés à ascendants, échancrés à l'insertion sur le pied, ils sont de couleur blanchâtre et virent au brun-ochracé-grisâtre avec l'âge. Les pores sont arrondis, plutôt fins et concolores aux tubes. Ils ne changent pas de couleur de façon significative au toucher.

1-6 Sporée : brun-tabac-olivâtre.

1-7 Habitat : sous les peupliers et particulièrement sous peupliers trembles d'août à novembre.

1-8 Répartition : espèce assez commune.

2-OBSERVATIONS

Le *Leccinum aurantiacum* comporte des synonymes autres que ceux indiqués plus haut (*Leccinum versipellis*, n'est pas un synonyme). Il existe aussi différentes formes de cette espèce.

Le genre *Leccinum* se distingue par le chapeau peu ou non visqueux et un pied élancé, raboteux, rugueux car couvert d'aspérités en relief.

Le genre *Leccinum* comporte beaucoup d'espèces. Pour les déterminer, il faut attacher une grande importance au biotope, aux couleurs (dont celles des aspérités du pied) et à leurs variations.

3-INTERÊT

Comestible agréable lorsqu'il est jeune. Un des meilleurs *Leccinum*.

4-RISQUES DE CONFUSION

Le bolet orangé est facilement confondu avec les autres bolets du genre *Leccinum* dès lors que ceux-ci présentent un chapeau orangé ou roux.

MAJ MJ 26 juillet 2013