

LECCINUM SCABRUM

Nom de référence : *Leccinum scabrum* (Bull.) Gray

Synonymes : *Boletus scaber* Bull.
Krombholziella scabra (Bull.) Maire

Classification : **Division :** Basidiomycota
Ordre : Boletales
Famille : Boletaceae

Nom français : bolet rude, bolet raboteux.

Intérêt culinaire : comestible acceptable



Photo : Michel Javayon

1-DESCRIPTION

- 1-1 Silhouette** : au sol, de dimension moyenne à grande avec un pied central surmonté d'un chapeau convexe. Couleur dominante : brun clair à grisâtre.
- 1-2 Chapeau** : de 4 à 12 cm, il est hémisphérique puis convexe et enfin aplani. Le revêtement est de coloration variable, de pratiquement de brun clair ou brun gris, à brun roux, il est lisse, marbré ou à peine velouté et se prolonge au niveau de la marge chez les jeunes sujets seulement. La surface est grasse et brillante par temps humide, il arrive qu'elle se craquèle avec la sécheresse. La marge est tout d'abord débordante puis vite arrondie et finalement rétrécie, laissant apparaître les tubes.
- 1-3 Pied ou stipe** : de 5-12 x 1,5-3,5 cm, il est cylindrique et épaissi en bas. En surface la couleur de fond est blanche, à peine teintée de jaune, la surface du pied est couverte de mèches brunes vite grises et enfin noirâtres, ces squamules sont fines, serrées et grossièrement alignées verticalement en haut du pied. Sa chair est blanchâtre généralement stable, sans traces de bleu-vert à la base du pied (ni avant, ni après la coupe).
- 1-4 Chair** : épaisse et ferme au début, elle devient vite spongieuse dans le chapeau. Elle est blanchâtre se teintant légèrement de rose après la coupe. Sous le revêtement elle est peut présenter des tons rosâtres. Elle développe une odeur aromatique et une saveur douce acidulée.
- 1-5 Tubes et pores** : les tubes sont facilement séparables de la chair du chapeau, ils aboutissent à de petits pores blanchâtres dans la jeunesse, ils deviennent gris et brunissent à la pression.
- 1-6 Sporée** : brune.
- 1-7 Habitat** : de juin à octobre sous les bouleaux.
- 1-8 Répartition** : espèce assez commune.

2-OBSERVATIONS

Le bolet rude est probablement le plus connu des *Leccinum*. Les mycologues ont décrit des variétés ou des formes du type. On donne souvent le nom de « bolet rude » aux *Boletaceae* du genre *Leccinum* lorsqu'on ne sait pas les identifier avec plus de précision...

3-INTERÊT

Ce champignon est un comestible sans grande valeur culinaire, faut-il encore qu'il soit très jeune.

4-RISQUES DE CONFUSION

Avec d'autres *Leccinum* qui portent un nom scientifique différent justifié par des variantes de couleurs, d'habitats, mais n'ayant pas forcément une valeur taxinomique évidente, tout au moins lors d'une identification macroscopique sur le terrain.

MAJ MJ le 31 juillet 2013