

LACTARIUS CIRCELLATUS

Nom de référence : *Lactarius circellatus* Fr.

Synonymes : *Lactifluus circellatus* (Fr.) Kuntze
Agaricus circellatus Battarra

Classification : **Division** : Basidiomycota
Ordre : Russulales
Famille : Russulaceae

Nom français : lactaire cerclé

Intérêt culinaire : aucun.



1-DESCRIPTION

1-1 Silhouette : au sol, de dimension moyenne avec un pied central surmonté d'un chapeau vite déprimé. Couleur dominante : beige-rosâtre.

1-2 Chapeau : de 4 à 10 cm, il est plan-convexe puis déprimé en entonnoir peu profond. Le revêtement est lubrifié par temps humide mais mat par temps sec, un peu givré et marqué de petites rides radiales (loupe). Le revêtement est de couleur gris-beige-rosâtre avec parfois des teintes violacées ou olivâtres, il est séparable de la chair du chapeau sur les 2/3 du rayon. Il est un peu pruiné, marqué de guttules, zoné par plusieurs cernes concentriques parfois peu nets. La marge est unie, incurvée, puis ondulée à lobée.

1-3 Pied ou stipe : de 2-6 x 1-2 cm, il est central, cylindrique mais un peu atténué de haut en bas, il est vite creux. La couche en surface (cortex) est épaisse. Sa surface est de couleur gris-beige-rosâtre, tout en haut elle est plus pâle en raison d'une pruine blanchâtre, alors qu'en bas elle est teintée de brun-rougeâtre. Elle est souvent tachée de guttules éparses (scrobicules) et marquée de fibres longitudinales.

1-4 Chair : épaisse, tendre, elle est blanchâtre sauf sous le revêtement du chapeau où elle est grise. Le lait est assez abondant chez les jeunes exemplaires, il est blanc immuable, âcre et amer. La chair est également âcre, son odeur est faible.

1-5 Lames : elles sont serrées, minces, largement adnées à subdécurrentes, rarement fourchues. Les lames sont crème-ochracé, elles se tachent de brun en vieillissant. Les lamelles et lamellules sont présentes. L'arête est mince, entière, concolore aux lames ou un peu plus pâle.

1-6 Sporée : ocre pâle.

1-7 Habitat : dans les bois de feuillus, les parcs. En été et en automne.

1-8 Répartition : espèce assez fréquente en plaine et en montagne. Elle vient généralement isolément.

2-OBSERVATIONS

Les lactaires à lait blanc ne sont pas comestibles.

L'épithète *circellatus* fait allusion aux cernes concentriques qui ornent le revêtement du chapeau.

3-INTERÊT

Aucun, espèce à rejeter.

4-RISQUES DE CONFUSION

Avec tous les lactaires à latex blanc et à chapeau zoné dont *Lactarius zonarius*, *Lactarius pyrogalus*, *Lactarius flexuosus* var. *roseozonatus* (= *Lactarius roseozonatus*).

MAJ MJ 24 juillet 2013