

LACTARIUS VOLEMUS

Nom de référence : *Lactarius volemus* (Fr.) Fr.

Synonymes : *Lactarius lactifluus* (L.) Quél.
Galorreus volemus (Fr.) P. Kumm.

Classification : **Division** : Basidiomycota
Ordre : Russulales
Famille : Russulaceae

Nom français : vachotte, lactaire à lait abondant.

Intérêt culinaire : comestible médiocre.



Photo : René Chalange

1-DESCRIPTION

- 1-1 Silhouette** : au sol, de dimension moyenne, avec un chapeau creusé surmontant un pied central. Couleur dominante : brun à roux.
- 1-2 Chapeau** : de 5 à 15 cm. Jeune, il est convexe mais le centre se creuse très vite. Le revêtement est sec, mat, prumineux au début puis finement velouté (loupe), il peut se craqueler. Il est de couleur orangé à roussâtre, le centre étant plus foncé. La marge est épaisse, lisse, enroulée puis arrondie.
- 1-3 Pied ou stipe** : de 5-9 x 1,5-2,5/3 cm. Il est central, plein, cylindrique ou en massue à fusiforme, légèrement aminci au sommet et parfois aussi à la base. Sa surface est lisse et de même couleur ou un peu plus pâle que le chapeau sauf au sommet où il est jaunâtre, en bas la surface se tache de brun.
- 1-4 Chair** : épaisse, ferme, blanchâtre, elle vire au brun-roux pâle après la coupe et laisse apparaître un lait blanc très abondant et devenant brun en séchant. Odeur de crustacé ou de topinambour, saveur douce.
- 1-5 Lames** : adnées, légèrement décurrentes à l'insertion sur le pied, elles sont assez serrées. Elles sont de couleur crème puis jaune orangé avec des taches brunâtres dans les endroits froissés ou avec l'âge. Présence de lamelles et lamellules. L'arête est aiguë, entière, concolore à la face des lames.
- 1-6 Sporée** : blanchâtre.
- 1-7 Habitat** : dans les bois de feuillus (surtout hêtres) et de résineux (surtout épicéas). Plutôt sur sol calcaire mais pas uniquement, du printemps jusqu'en automne.
- 1-8 Répartition** : espèce fréquente aussi bien en plaine qu'en montagne où elle vient isolément ou en petit groupe.

2-OBSERVATIONS

Espèce à protéger.

3-INTERÊT

Ce lactaire n'est pas toxique mais ne présente aucun intérêt culinaire.

4-RISQUES DE CONFUSION

Ne peut être confondu qu'avec le lactaire flamboyant (*Lactarius rugatus*) plus petit et plus méridional et à chapeau vite ridé.

Vérfifié le 8 janvier 2014