

LACTARIUS HELVUS

Nom de référence : *Lactarius helvus* (Fr.) Fr.

Synonymes : *Lactifluus helvus* (Fr.) Kuntze
Agaricus helvus Fr.

Classification : **Division** : Basidiomycota
Ordre : Russulales
Famille : Russulaceae

Nom français : lactaire à odeur de chicorée, lactaire brun-jaune.

Intérêt culinaire : comestible sans intérêt.



1-DESCRIPTION

- 1-1 Silhouette** : au sol, de dimension moyenne à grande avec un pied central surmonté d'un chapeau plan-convexe puis déprimé. Couleur dominante : brun-jaune à brun-roussâtre.
- 1-2 Chapeau** : de 4 à 15 cm, il est plan-convexe puis creusé et présente parfois un mamelon au fond de la dépression. Le revêtement est sec et mat, il est de couleur brun-jaune à brun orangé et même vineux ochracé avec des reflets rosés. Taché ou non de guttules sombres, il est marqué d'un feutrage plissé-chiffonné qui peut se craqueler (loupe). La marge est enroulée puis droite et souvent flexueuse, mince, pruineuse (loupe) et parfois fendillée, elle conserve les couleurs du revêtement en plus pâle.
- 1-3 Pied ou stipe** : de 4-10 x 1-3 cm, il est central, cylindrique plus ou moins régulier, farci puis creux. Sa surface est mate, ochracé carné ou orange ochracé, elle devient roussâtre en vieillissant. Pruineuse de blanc, elle est plus pâle tout en haut et feutrée de blanchâtre tout en bas.
- 1-4 Chair** : tendre, fragile, humide, elle est blanche mais vire au roussâtre à la coupure, elle est jaune ochracé sous le revêtement du chapeau. La saveur est douce alors que l'odeur est celle de la chicorée ou de la coumarine (l'odeur est encore plus nette sur les champignons desséchés). Le latex est abondant chez les jeunes champignons, il se tarit plus tard. Ce latex est doux, il a la particularité d'être aqueux, limpide, incolore.
- 1-5 Lames** : adnées à subdécurrentes à l'insertion sur le pied, elles sont serrées et minces. Les lamelles et lamellules sont nombreuses. Les lames sont fourchues et interveinées. Elles sont de couleur crème ochracé puis ocre orangé. L'arête est mince, entière, concolore à la face des lames
- 1-6 Sporée** : crème lavé de rose.
- 1-7 Habitat** : surtout sous les épicéas, les pins, les bouleaux, dans la mousse et dans l'herbe des milieux très humides (sphaignes), sur sol acide. En été et en automne.
- 1-8 Répartition** : espèce fréquente en plaine et en montagne.

2-OBSERVATIONS

Les lactaires à lait blanc ne sont pas comestibles.

3-INTERÊT

Faible, espèce à négliger.

4-RISQUES DE CONFUSION

Ils sont rares si le récolteur constate un latex aqueux/limpide.

Vérfifié le 12 décembre 2013