

LACTARIUS PIPERATUS

Nom de référence : *Lactarius piperatus* (L.) Pers.

Synonymes : *Lactifluus piperatus* (L.) Kuntze
Agaricus piperatus L.

Classification : Division : Basidiomycota
Ordre : Russulales
Famille : Russulaceae

Nom français : Lactaire poivré, vache blanche.

Intérêt culinaire : non comestible.



1-DESCRIPTION

- 1-1 Silhouette** : au sol, de dimension moyenne à grande avec un pied central surmonté d'un chapeau plan-convexe puis creusé. Couleur dominante : blanche.
- 1-2 Chapeau** : de 4 à 15 cm, il est plan-convexe, puis largement mais peu profondément creusé en son centre, il est parfois un peu difforme. Le revêtement est sec, mat, lisse, à peine rugueux et porte quelques rides radiales ou irrégularités au disque central (loupe), il se craquèle parfois près de la marge. Il est blanc, des taches jaune-rouille apparaissent plus tard, l'ensemble du revêtement ayant tendance à roussir dans la vétusté. La marge est incurvée puis droite, mince, régulière ou encore ridée à fripée, ondulée.
- 1-3 Pied ou stipe** : de 4-11- x 1-4 cm, il est généralement central, cylindrique ou atténué en bas, souvent boursoufflé avec l'âge. Il est plein et dur. Sa surface est mate, lisse, blanche puis crème et enfin brunâtre à partir du bas.
- 1-4 Chair** : épaisse, compacte, dure, cassante, elle est blanche et devient crème-jaunâtre après la coupe (elle devient brunâtre 24h après la coupe). Son odeur d'huile est peu agréable, sa saveur est très âcre. Le lait est peu abondant, épais, très âcre, blanc immuable à l'air, il jaunit à peine en séchant sur les lames.
- 1-5 Lames** : elles sont très serrées, minces, adnées à décurrentes. Les lamelles et lamellules sont nombreuses. Les lames sont fourchues un peu n'importe où sur la longueur. Elles sont de couleur blanche avec une nuance crème-carné puis jaunâtre, elles brunissent aux endroits blessés. L'arête est mince, entière et concave à la face des lames
- 1-6 Sporée** : crème.
- 1-7 Habitat** : surtout sous feuillus, hêtres, charmes, dès la fin du printemps et en été
- 1-8 Répartition** : espèce fréquente en plaine et en montagne.

2-OBSERVATIONS

Les lactaires à lait blanc ne sont pas comestibles.

3-INTERÊT

Aucun, espèce à négliger.

4-RISQUES DE CONFUSION

Il existe des risques avec tous les lactaires blancs dont *Lactarius pergamenus*, *Lactarius vellereus*, *Lactarius controversus*.

MAJ MJ 24 juillet 2013