

## RUSSULA NOBILIS

**Nom de référence** : *Russula nobilis* Velen.

**Synonymes** : *Russula fageticola* (Romagn.) Bon  
*Russula mairei* Singer

**Classification** : **Division** : Basidiomycota  
**Ordre** : Russulales  
**Famille** : Russulaceae

**Nom français** : russule noble, russule émétique du hêtre, russule du hêtre.

**Intérêt culinaire** : non comestible.



Photo Wikimedia

## 1-DESCRIPTION

**1-1 Silhouette** : au sol, de dimension moyenne avec un pied central surmonté d'un chapeau, convexe puis étalé. Couleur dominante : rouge.

**1-2 Chapeau** : de 3 à 7 cm. Convexe, il s'aplanit ensuite et finit par être étalé mais jamais profondément déprimé. Le revêtement, de couleur rouge vif, est lisse et discrètement bosselé, mat par temps sec, brillant et lubrifié par temps humide. Il est séparable de la chair du chapeau sur 1/3 à 1/2 du rayon. En vieillissant il se décolore en blanc (sans traces jaunâtres ou ochracées) à partir de la périphérie. La marge est droite, sauf sur les vieux exemplaires où elle est relevée (récurvée), fine, lisse à brièvement striée ou cannelée ; elle pâlit assez rapidement.

**1-3 Pied ou stipe** : de 3-6 x 1-2 cm, il est central, cylindrique, souvent épaissi au milieu ou dans la moitié inférieure, et plein. En surface il est de couleur blanche qui tend à jaunir un peu à partir de la base ; il est prumineux chez le jeune champignon et finement veiné longitudinalement (loupe).

**1-4 Chair** : ferme, blanche, sauf sous le revêtement du chapeau où elle est rose. Elle est à peine lavée de jaune plus tard. L'odeur est fruitée et la saveur très âcre.

**1-5 Lames** : adnées à sublibres à l'insertion sur le pied, elles sont assez serrées et de couleur blanche à reflets glauques ; elles peuvent se tacher de brun en vieillissant. Quelques lames sont fourchues près du pied. Les lamelles et lamellules sont rares ou peu nombreuses. L'arête est aiguë, entière et concolore à la face des lames.

**1-6 Sporée** : blanche.

**1-7 Habitat** : à tendance calcicole dans les bois un peu humides, dans les hêtraies et les bois mêlés. Du début de l'été jusqu'à la fin de l'automne.

**1-8 Répartition** : espèce assez fréquente aussi bien en plaine qu'en montagne où elle vient isolément ou en petits groupe.

## 2-OBSERVATIONS

Cette russule est couramment nommée *Russula fageticola*, plus rarement *Russula mairei*. Son nouveau nom *Russula nobilis* est encore peu utilisé.

Certains auteurs font de *Russula nobilis* et de *Russula fageticola* une seule et même espèce. D'autres en font deux espèces, certes très proches, mais distinctes l'une de l'autre en attribuant à *Russula fageticola* un revêtement du chapeau rouge moins vif, un pied moins trapu, une pousse dans les hêtraies à tendance acide et non à tendance calcaire.

L'épithète *fageticola* a été donnée car ce champignon vient essentiellement sous les hêtres (*Fagus*).

La chair des russules étant granuleuse, leur pied casse comme un bâton de craie, il est donc impossible de tirer des lanières de la chair ou du cortex du pied.

## 3-INTERÊT

A rejeter, cette russule doit être considérée comme toxique.

## 4-RISQUES DE CONFUSION

Lire le paragraphe 2-OBSERVATIONS. Les risques de confusion existent aussi avec d'autres russules rouges, âcres, à lames blanches et plus particulièrement *Russula emetica* var. *silvestris* (= *Russula silvestris*).

**Vérfié le 16 janvier 2014**