

RUSSULA PARAZUERA

Nom de référence : *Russula parazurea* Jul. Schäff.

Synonymes : *Russula palumbia* subsp. *parazurea* (Jul. Schäff.) Konrad & Maubl.

Classification : **Division** : Basidiomycota

Ordre : Russulales

Famille : Russulaceae

Nom français : russule presque bleue.

Intérêt culinaire : à rejeter.



1-DESCRIPTION

- 1-1 Silhouette** : au sol, de dimension moyenne avec un pied central surmonté d'un chapeau globuleux, convexe puis creusé. Couleur dominante : gris-bleuté-violacé.
- 1-2 Chapeau** : de 5 à 10 cm. Il est convexe puis étalé et enfin déprimé, ombiliqué. Le revêtement est séparable de la chair du chapeau sur la moitié du rayon. Le revêtement est vite sec et mat, il est fortement pruineux ou même feutré à velouté tomenteux et présente des veines radiales en saillie. Il est vert-bleu foncé, gris-bleuté à gris-violacé et se tache de brun, généralement il brunit avec l'âge surtout à partir du centre. La marge reste longtemps enroulée, elle est légèrement translucide et plus pâle que l'ensemble du revêtement, elle se marque de cannelures et peut même se fendre avec la vieillesse.
- 1-3 Pied ou stipe** : de 3-6 x 1-2 cm, est central, généralement aminci dans la moitié supérieure mais évasé juste sous les lames, la base est épaissie. Il est ferme, plein, puis farci et creux. Sa surface est blanche et lisse, souvent elle se tache de brun-ochracé à partir de la base.
- 1-4 Chair** : assez peu épaisse, elle est ferme, blanche même sous le revêtement du chapeau. L'odeur est faible, la saveur est douce mais un peu âcre dans les lames.
- 1-5 Lames** : assez serrées sur le jeune champignon, elles sont plus espacées ensuite, adnées, ascendantes à l'insertion sur le pied, elles sont friables, quelques lames sont fourchues-interveinées à proximité du pied. Elles sont de couleur crème puis crème-ochracé avec ou sans reflets orangés dans les sinus. Les lames et les lamellules sont rares. L'arête est aiguë, entière et concolore aux faces.
- 1-5 Sporée** : crème assez foncé.
- 1-7 Habitat** : sous les feuillus divers, plutôt sur terrain acides, argileux, sablonneux. De juin à fin octobre. Cette espèce est rare sous résineux.
- 1-8 Répartition** : espèce assez fréquente aussi bien en plaine qu'en montagne où elle vient isolément ou en petits groupes.

2-OBSERVATIONS

Dans la forme *dibapha* la surface du pied est lavée de crème-rosâtre à violacé.

3-INTERÊT

Il ne s'agit pas d'un comestible apprécié.

4-RISQUES DE CONFUSION

Des risques de confusion existent surtout avec *Russula subterfucata* et avec la plupart des russules du groupe *griseineae*.

Vérfié le 16 mai 2013