

RUSSULA PSEUDOINTEGRA

Nom de référence : *Russula pseudointegra* Arnould & Goris

Synonymes : aucun

Classification : Division : Basidiomycota

Ordre : Russulales

Famille : Russulaceae

Nom français : russule fausse intègre, russule coccinée.

Intérêt culinaire : à rejeter.



1-DESCRIPTION

- 1-1 Silhouette** : au sol, de dimension moyenne à grande avec un pied central surmonté d'un chapeau hémisphérique, convexe et enfin aplati. Couleur dominante : rouge.
- 1-2 Chapeau** : de 4 à 13 cm. Il est d'abord hémisphérique puis convexe, ensuite étalé et même déprimé. Le revêtement est lubrifié et brillant par temps humide, il est velouté mais glabre de place en place et possède de petites veines radiales (loupe), plus près de la marge il est marqué de petites masses de pruine blanche (loupe). Il est rouge-cinabre à rouge-écarlate se décolorant en rose carné ou crème ochracé pâle. Il est séparable de la chair du chapeau sur 1/2 à 2/3 du rayon. La marge est obtuse, incurvée puis souvent relevée sur le tard, ondulée, elle est unie puis très brièvement cannelée, elle est concolore aux lames au début mais reste plus pâle ensuite.
- 1-3 Pied ou stipe** : de 4-9 x 2-3 cm, central, il est cylindrique, un peu aminci en bas et légèrement évasé juste sous les lames, il est plein puis farci d'une moelle en mie de pain qui est très caractéristique de cette espèce. Sa surface est pruineuse au sommet chez le jeune champignon (loupe), elle est légèrement veinée en bas, elle est blanche et grisonne à peine avec l'âge.
- 1-4 Chair** : assez épaisse et dure dans le chapeau, elle est de couleur blanche, elle brunit longtemps après la coupe. Elle est rougeâtre sous le revêtement du chapeau. Sa saveur est douce puis amère et plus ou moins âcre, son odeur est fruitée et mentholée.
- 1-5 Lames** : ascendantes/adnées à l'insertion sur le pied, elles sont moyennement serrées, minces, friables, de couleur longtemps blanchâtre, elles deviennent crème ochracé assez vif. Certaines sont fourchues à proximité du pied ou de la marge, elles sont interveinées au fond des sinus. Les lamelles et les lamellules sont inexistantes ou rares. L'arête est mince, unie ou un peu dentelée, elle est pâle.
- 1-6 Sporée** : jaune clair à jaune doré.
- 1-7 Habitat** : cette espèce vient dans l'herbe sous les feuillus, dans les chemins boueux, elle préfère les sols humides argileux, acides. On la trouve en été et en automne.
- 1-8 Répartition** : cette espèce est assez commune en plaine et en montagne.

2-OBSERVATIONS

Malgré son nom la *Russula pseudointegra* n'a aucun rapport avec la *Russula integra*.

La chair des russules étant granuleuse, leur pied casse comme un bâton de craie, il est donc impossible de tirer des lanières de la chair ou du cortex du pied.

3-INTERÊT

Cette espèce n'est pas comestible.

4-RISQUES DE CONFUSION

Les risques de confusion existent avec toutes les russules rouges et particulièrement *Russula tinctipes*, *Russula rosea* (= *Russula lepida*).

Vérifié