

GEOPORA SUMNERIANA

Nom de référence : *Geopora sumneriana* (Cooke) M. Torre

Synonymes : *Sepultaria sumneriana* (Cooke) Masee
Peziza sumneriana Cooke

Classification : **Division :** Ascomycota
Ordre : Pezizales
Famille : Pyronemataceae

Nom français : géopore des cèdres, pézize des cèdres, géopore de Sumner

Intérêt culinaire : aucun.



Photo Patrice Canal

1-DESCRIPTION

1-1 Silhouette : au sol, de dimension faible à moyenne, ce champignon, profondément enfoui, est en forme de coupelle ou de vase aux bords irréguliers. Couleur dominante : brun-jaunâtre.

1-2 Chapeau ou réceptacle : de 2 à 8 cm de diamètre. Les mycologues nomment ce réceptacle apothécie, il est en forme de petites sphères éclatées, un peu enfouies puis à ras de terre, l'intérieur est gris clair à jaunâtre, il est lisse et présente des ondulations, la face extérieure est brune, feutrée de longs poils souples. La marge est déchirée, lobée.

1-3 Pied ou stipe : absent.

1-4 Chair : elle est épaisse, blanchâtre et cassante. L'odeur et la saveur sont peu marquées.

1-5 Lames, tubes et pores, aiguillons : néant. L'hyménium se situe sur la face interne de la coupe.

1-6 Sporée : blanche.

1-7 Habitat : surtout sous les cèdres, plus rarement sous les thuyas ou les ifs. Au printemps, il est très fidèle à ses stations d'une année sur l'autre. Plusieurs exemplaires sont souvent serrés les uns contre les autres.

1-8 Répartition : assez commune.

2-OBSERVATIONS

3-INTERÊT

Aucun.

4-RISQUES DE CONFUSION

Facile à reconnaître par son habitat particulier et sa venue au printemps.

Vérifié 22 novembre 2012

MAJ MJ 22 juillet 2013