

## SUILLUS VARIEGATUS

**Nom de référence** : *Suillus variegatus* (Sw.) Kuntze

**Synonymes** : *Boletus variegatus* Sw.  
*Ixocomus variegatus* (Sw.) Quélet

**Classification** : **Division** : Basidiomycota  
**Ordre** : Boletales  
**Famille** : Boletaceae

**Nom français** : bolet moucheté, bolet tacheté.

**Intérêt culinaire** : aucun.



Photo : René Chalange

## **1-DESCRIPTION**

- 1-1 Silhouette** : au sol, de dimension moyenne à grande avec un pied central surmonté d'un chapeau convexe. Couleur dominante : jaune ochracé.
- 1-2 Chapeau** : de 5 à 15 cm. Il est hémisphérique puis convexe et enfin étalé. Son revêtement est de couleur brun-jaune souvent teintée d'olivâtre, il est gras seulement par temps humide sinon il est sec, il n'est jamais visqueux. Le revêtement est entièrement tacheté par de fines méchules veloutées se transformant en fines écailles brun-olivacé (loupe). Il est peu séparable de la chair. La marge est fine, concolore au revêtement, elle est enroulée dans la jeunesse.
- 1-3 Pied ou stipe** : de 4-10 x 1-3 cm, il est cylindrique, parfois un peu ventru ou renflé à la base. Sa surface est lisse et de couleur plus pâle que le revêtement du chapeau (jaune ochracé clair), elle est plus foncée en bas du pied. Dans sa partie inférieure la surface est lisse ou faiblement feutrée. Le pied ne possède pas d'anneau.
- 1-4 Chair** : la chair du chapeau est assez épaisse, elle est de couleur blanc-jaunâtre. Après la coupe elle bleuit plus ou moins fortement, surtout au-dessus des tubes, celle du pied est blanchâtre et bleuit à peine à la coupe, ces bleuissements ne sont pas toujours perceptibles. La chair est ferme lorsque le champignon est jeune, elle devient plus molle ensuite. La saveur est douce, l'odeur est fruitée, un peu acidulée et même caoutchoutée ou chlorée.
- 1-5 Tubes et pores** : ils sont adnés à légèrement décurrents au point d'insertion avec le pied. Les tubes sont facilement séparables de la chair du chapeau, ils sont assez longs, jaune sale puis ils se teintent d'olivâtre. Les pores sont ronds ou un peu anguleux (loupe), amples (jusqu'à 1 mm) mais densément serrés, ils sont concolores aux tubes. Les tubes et les pores bleussent faiblement au toucher.
- 1-6 Sporée** : brun olive tabac.
- 1-7 Habitat** : dans les bois de résineux, surtout de pins et plutôt sur terrain acide et sablonneux de septembre à novembre.
- 1-8 Répartition** : espèce fréquente en plaine et montagne.

## **2-OBSERVATIONS**

Le genre *Suillus* appartient au groupe des bolets. Il se caractérise par un chapeau lubrifié/visqueux (*Suillus variegatus* est une exception car son chapeau est sec, sauf par temps humide) et un habitat sous les conifères. Les pores sont jaunes à olivâtres, le pied de certains *Suillus* porte un anneau.

## **3-INTERÊT**

Comestible mais sans aucun intérêt.

## **4-RISQUES DE CONFUSION**

Les autres *Suillus*, en particulier *Suillus bovinus*, *Suillus bellinii*.

**Vérifié le 14 mars 2013**