

XEROCOMELLUS CHRYSENTERON

Nom de référence : *Xerocomellus chrysenteron* (Bull.) Sutara

Synonymes : *Xerocomus chrysenteron* (Bull.) Quéf.

Boletus chrysenteron Bull.

Classification : **Division** : Basidiomycota

Ordre : Boletales

Famille : Boletaceae

Nom français : bolet à chair jaune.

Intérêt culinaire : comestible très médiocre.



1-DESCRIPTION

1-1 Silhouette : au sol, de dimension moyenne avec un pied central surmonté d'un chapeau convexe. Couleur dominante : brun terne à bistre.

1-2 Chapeau : de 4 à 10/11 cm. Il est hémisphérique puis convexe. Le revêtement est de couleur brun terne à sépia ou brun-roux teinté d'olivâtre et localement nuancé de rougeâtre. Le revêtement est mat, finement velouté, il se craquèle, laissant apparaître une chair rouge au fond des crevasses. La marge est aiguë.

1-3 Pied ou stipe : de 4-8 x 0,5-2 cm, il est cylindrique et élancé, souvent arqué ou courbé. Sa surface est jaune mais plus bas elle est vite marquée de fibres ou de points rougeâtres donnant l'apparence d'un pied rouge, elle demeure jaune en haut. Le pied bleuit légèrement au toucher Il est plein et assez rigide. Sa base peut s'élargir ou, au contraire, se rétrécir.

1-4 Chair : elle est jaunâtre pâle, sauf sous le revêtement du chapeau où elle est rouge-violacé. Elle bleuit lentement et faiblement à la coupe surtout au-dessus des tubes, puis elle vire sensiblement au rouge. Elle est brun-rouge à la base du stipe. La chair se ramollit vite. L'odeur est faible et un peu acidulée, la saveur est également faible et douce quoiqu'un peu acidulée ou même légèrement amère.

1-5 Tubes et pores : les tubes sont facilement séparables de la chair du chapeau, ils sont longs et de couleur jaune pâle. Ils sont adnés échancrés et même décurrents en filet à l'insertion sur le pied. Avec l'âge ils prennent une teinte jaune-verdâtre, les tubes se teintent en bleu-vert après la coupe. Les pores sont larges et anguleux, ils sont concolores aux tubes et virent au bleu-vert au toucher.

1-6 Sporée : jaune-olive.

1-7 Habitat : dans les bois feuillus et de résineux, cette espèce est ubiquiste, on la trouve d'août/ septembre au début de l'hiver, elle préfère les lieux herbeux.

1-8 Répartition : espèce très commune partout.

2-OBSERVATIONS

Les *Boletaceae* du genre *Xerocomus* appartiennent maintenant au genre *Xerocomellus*.

Le bolet à chair jaune est parfois cueilli par les mycophages, il ne l'est pas par les mycologues. Les scientifiques distinguent des formes ou des variétés, toujours très voisines de l'espèce type.

3-INTERÊT

Comestible, sans aucun intérêt culinaire.

4-RISQUES DE CONFUSION

Ils sont nombreux mais le risque d'intoxication alimentaire reste faible ou nul. Il peut être confondu avec les différentes formes et variétés de l'espèce, mais aussi *Xerocomellus rubellus*, *Xerocomellus pruinosus*, *Xerocomellus communis*, *Xerocomellus poroporus*, etc.

Vérfifié le 7 mars 2013

MAJ MJ septembre 2013