

LACTARIUS BLENNIUS

Nom de référence : *Lactarius blennius* (Fr.) Fr.

Synonymes : *Agaricus blennius* Fr.
Lactifluus blennius (Fr.) Kuntze

Classification : **Division** : Basidiomycota
Ordre : Russulales
Famille : Russulaceae

Nom français : lactaire muqueux.

Intérêt culinaire : aucun.



1-DESCRIPTION

- 1-1 Silhouette** : au sol, de dimension moyenne avec un pied central surmonté d'un chapeau vite déprimé. Couleur dominante : brun-grisâtre.
- 1-2 Chapeau** : de 3 à 8 cm, il est convexe puis vite déprimé en forme d'entonnoir large et peu profond. Le revêtement est brillant, très nettement visqueux par temps humide mais simplement collant par temps sec (test du baiser). Il est de couleur gris-brun mêlé de vert-olivâtre mais au centre il est discrètement lavé de brun-rouge. En périphérie le revêtement est à peine zoné et maculé de guttules concentriques de couleur bistre. Le revêtement est détachable sur 1/4 du rayon. La marge est unie ou à peine striée, enroulée, ondulée, lobée, elle présente souvent une petite bande blanchâtre en périphérie.
- 1-3 Pied ou stipe** : de 4-8 x 0,5-2 cm, il est central, cylindrique mais un peu atténué en bas, il est plein puis farci et enfin creux. La couche en surface (cortex) est épaisse, collante ou visqueuse, elle est plus pâle que le revêtement du chapeau, sa couleur est crème-grisâtre, à vert-olivâtre pâle. La surface peut être tachée de guttules éparses et marquée de fins sillons longitudinaux blanchâtres, elle brunit à peine au frottement.
- 1-4 Chair** : épaisse, plutôt molle mais cassante, elle est blanchâtre sauf sous la cuticule et dans le cortex du pied où elle est gris-verdâtre. La chair grisonne légèrement après la coupe. Sa saveur est âcre à la mastication, son odeur est faiblement épicée. A la lésion le lait est assez abondant, il est blanc mais devient très lentement gris-olivâtre en séchant, ce qui peut tacher les lames. Le lait est âcre, piquant.
- 1-5 Lames** : largement adnées à subdécurrentes à l'insertion sur le pied, elles sont serrées, minces, quelques unes sont fourchues à proximité du pied. Les lamelles et lamellules sont présentes. Les lames sont blanchâtres puis crème et finalement jaune-ochracé clair. L'arête est mince, entière, concolore aux lames ou tachée dans les blessures.
- 1-6 Sporée** : blanc-crème avec une discrète touche rose pâle.
- 1-7 Habitat** : dans les bois de feuillus (hêtres principalement, plus rarement sous charmes). En été et en automne.
- 1-8 Répartition** : espèce assez fréquente en plaine et en moyenne montagne, inexistante en haute montagne. Elle vient en petit groupe, mais parfois isolément.

2-OBSERVATIONS

Ce lactaire appartient au groupe des *Lactarius glutinosus* caractérisé par un chapeau très visqueux sur le frais et un lait verdissant, grisonnant ou brunissant en séchant. Les lactaires à lait blanc ne sont pas comestibles.

3-INTERÊT

Ce lactaire n'est pas comestible.

4-RISQUES DE CONFUSION

Avec tous les lactaires visqueux de couleur sombre dont le *Lactarius fluens*.

Vérfié le 11 avril 2013

