

LACTARIUS CHRYSORRHEUS

Nom de référence : *Lactarius chrysorrheus* Fr.

Synonymes : *Lactifluus chrysorrheus* (Fr.) Kuntze
Lactarius theiogalus var. *chrysorrheus* (Fr.) Quélet

Classification : **Division :** Basidiomycota

Ordre : Russulales

Famille : Russulaceae

Nom français : lactaire à lait jaunissant, lactaire à lait jaune d'or, lactaire à lait doré.

Intérêt culinaire : aucun.



1-DESCRIPTION

1-1 Silhouette : au sol, de dimension moyenne avec un pied central surmonté d'un chapeau peu déprimé. Couleur dominante : jaune-orange.

1-2 Chapeau : de 4 à 8 cm. Il est bassement convexe mais vite étalé / déprimé en entonnoir peu profond. Le revêtement est sec et prumineux par le sec, il est légèrement lubrifié par temps humide. Il est de couleur jaune-orange pâle et présente des cercles concentriques guttulés plus foncés de couleur ocre à rose-orangé. Ces zones concentriques disparaissent peu à peu avec l'âge. Le revêtement est détachable sur la moitié du rayon. Très jeune la marge possède de fines fibrilles apprimées (loupe) ensuite elle est glabre, fine, unie, un peu ondulée et enroulée vers l'intérieur mais elle finit par se redresser.

1-3 Pied ou stipe : de 2-6 x 0,5-2 cm. Il est central, cylindrique mais aminci en bas, plein puis creux sur le tard. La couche en surface (cortex) est assez épaisse, sèche, finement pruneuse (loupe). Elle est blanchâtre ou concolore au chapeau. La base est plus foncée.

1-4 Chair : assez épaisse, elle est cassante, ferme puis molle. Elle est blanche mais devient vite jaune-soufre après la coupe. Sa saveur est amarescente et âcrescente à la fois, l'odeur est faible mais un peu fruitée. Le lait est abondant, fluide, blanc mais il jaunit rapidement à l'air, il est de saveur âcre.

1-5 Lames : elles sont serrées, minces, largement adnées à subdécurrentes, fourchues à la marge et certaines le sont à proximité du pied. Les lames sont blanchâtres puis crème et présentent, avec l'âge, des reflets roux-orangé. Les lamelles et lamellules sont nombreuses. L'arête est mince, entière, concolore aux lames. Les lames meurtries présentent des taches jaunes dues aux gouttelettes de lait sec.

1-6 Sporée : blanche à blanc-crème.

1-7 Habitat : dans les bois de feuillus (chênes) plus rare sous résineux. En été et en automne et plutôt sur les sols non calcaires.

1-8 Répartition : espèce assez fréquente en plaine et en haute montagne. Elle vient en petits groupes, parfois isolément.

2-OBSERVATIONS

Les lactaires à lait jaune ne sont pas comestibles.

3-INTERÊT

Aucun.

4-RISQUES DE CONFUSION

Ils sont rares pour qui est attentif au jaunissement du lait et à la saveur de la chair. On peut malgré tout confondre ce champignon avec *Lactarius decipiens*.

Vérfifié le 31 janvier 2013

MAJ MJ 24 juillet 2013