

LACTARIUS SALMONICOLOR

Nom de référence : *Lactarius salmonicolor* Heim & Leclair

Synonymes : *Lactarius subsalmoneus* Pouzar
Lactarius salmoneus Heim & Leclair

Classification : **Division :** Basidiomycota
Ordre : Russulales
Famille : Russulaceae

Nom français : Lactaire couleur saumon, lactaire du sapin.

Intérêt culinaire : comestible très médiocre.



1-DESCRIPTION

- 1-1 Silhouette** : au sol, sous les sapins, de dimension moyenne à grande avec un pied central surmonté d'un chapeau convexe puis peu déprimé. Couleur dominante : jaune-rose-orangé.
- 1-2 Chapeau** : de 6 à 15 cm. Il est convexe puis aplani et finalement un peu déprimé, il est un peu bosselé. Le revêtement est très peu séparable de la chair du chapeau, il est luisant, lubrifié à un peu visqueux par temps humide (test du baiser) mais il est mat par temps sec, il possède de fines fibrilles radiales (loupe) et ridé vers la marge. Sa couleur va du jaune-orangé à l'orange-saumon, elle est marquée de cernes concentriques fins et discrets de couleur orange vif. Le revêtement ne verdit pas ou à peine, mais il brunit au froissement. La marge est fine, enroulée, ondulée, un peu feutrée (loupe) et de couleur plus pâle que le chapeau.
- 1-3 Pied ou stipe** : de 3-8 X 1-3 cm. Il est central, robuste, renflé au milieu, très vite creux. En surface, il est humide, brillant, concolore au revêtement du chapeau et présente ou non quelques scrobicules ou ponctuations brun-orange, il est plus clair au sommet.
- 1-4 Chair** : peu épaisse, elle est ferme puis molle. Elle est orange à ochracé clair, sauf sous la cuticule et sous la surface du pied (cortex) où elle est orange-saumon. La chair passe au brun-rougeâtre après la coupe puis en une heure environ au brun vineux. Sa saveur est douce puis amère et astringente, son odeur est douce à fruitée. Le lait est abondant, orange-saumon dès la coupe, il vire très lentement au brun-vineux sans se teinter de vert. Le lait est astringent, un peu piquant.
- 1-5 Lames** : elles sont sèches, serrées, minces, largement adnées à décourrentes, très rarement fourchues. Lamelles et lamellules présentes. Les lames sont jaune-orange-saumon. L'arête est aiguë, entière et concolore aux faces des lames.
- 1-6 Sporée** : ocre pâle.
- 1-7 Habitat** : dans les bois de sapins uniquement (quoique certains auteurs signalent sa présence sous épicéas...). Cette espèce est tardive, elle vient en automne.
- 1-8 Répartition** : espèce assez fréquente en plaine et en montagne. Elle vient isolément ou en petit groupe.

2-OBSERVATIONS

Les lactaires à lait rouge, d'orange-carotte à rouge sombre, sont comestibles. Ceux d'excellente qualité (*Lactarius sanguifluus*) et de bonne qualité (*Lactarius deliciosus*, etc.) viennent sous les pins. Ceux de médiocre qualité (*Lactarius salmonicolor*, *Lactarius deterrimus*) viennent respectivement sous les sapins, les épicéas. Les lactaires à lait rouge colorent les urines.

3-INTERÊT

Ce lactaire est un bien médiocre comestible.

4-RISQUES DE CONFUSION

Il faut bien observer les caractères tels que les ornementsations, la couleur du lait et avoir identifié l'habitat pour éviter les confusions.

Vérifié le 14 avril 2013

MAJ MJ le 5 août 2013