

AGROCYBE PRAECOX

Nom de référence : *Agrocybe praecox* (Pers.) Fayod

Synonymes : *Pholiota praecox* (Pers.) P. Kumm.
Agrocybe gibberosus Fr.

Classification : **Division** : Basidiomycota
Ordre : Agaricales
Famille : Strophariaceae

Nom français : agrocybe précoce, pholiote précoce.

Intérêt culinaire : comestible médiocre.



1-DESCRIPTION

- 1-1 Silhouette** : au sol, de dimension moyenne avec un pied central surmonté d'un chapeau convexe à aplati. Couleur dominante crème ochracé.
- 1-2 Chapeau** : de 3 à 8 cm. Hémisphérique, convexe, puis aplati, au centre il présente un petit mamelon peu marqué, il est hygrophane. Le revêtement est brun roussâtre ou beige pâle, il pâlit à partir de la marge par temps sec, il est brillant par temps humide mais mat par temps sec il devient alors ridé et même craquelé. La marge est aiguë, infléchie, assez rarement ornée par des restes blancs du voile pendant au bord.
- 1-3 Pied ou stipe** : 4-12 x 0,5-1,5 cm, il est crème, cylindrique, sa base est plus ou moins bulbeuse avec des rhizoïdes blancs. Sa surface est ornée de fibrilles longitudinales blanchâtres. Il est pourvu d'un anneau blanc pouvant recouvrir les lames dans la jeunesse, plus tard il est en forme de jupe et sa face supérieure est colorée de brun par la chute des spores. Finalement, cet anneau se limite à une mince pellicule qui remonte sur le pied. Le pied se creuse en vieillissant.
- 1-4 Chair** : elle est épaisse au centre du chapeau où elle est blanche mais marquée de brunâtre au-dessus des lames. Elle devient plus nettement brun ochracé dans le pied. L'odeur est farineuse, un peu rance. La saveur est généralement désagréable et amarescente mais parfois douce.
- 1-5 Lames** : larges, adnées à échanquées ou même un peu décurrentes à l'insertion sur le pied, elles sont d'abord crème, puis chocolat. Lamelles et lamellules sont présentes. L'arête est entière, légèrement denticulée (loupe).
- 1-6 Sporée** : brun tabac.
- 1-7 Habitat** : au printemps, dans les taillis et les bois herbeux, au bord des chemins, parfois dans les prairies, il pousse en groupe ou isolé.
- 1-8 Répartition** : de la plaine à l'étage montagnard, sur tous les substrats.

2-OBSERVATIONS

Le revêtement du chapeau de certaines espèces du genre *Agrocybe* est formé de cellules rondes. C'est pour cela qu'il peut se craqueler par temps sec, contrairement aux autres revêtements, fibrilleux et donc plus résistants.

3-INTERÊT

Comestible médiocre.

4-RISQUES DE CONFUSION

On peut surtout confondre l'agrocybe précoce avec l'agrocybe à pied ferme (*Agrocybe molesta* = *Agrocybe dura*) mais aussi avec l'*Agrocybe pediades* sans anneau net, ou encore avec l'*Agrocybe xanthocystis* qui a des lames plus jaunes, ou bien avec l'*Agrocybe elatella* qui pousse dans des lieux humides et dont le pied possède un anneau ascendant et n'a pas de cordons mycéliens.

| <i>Agrocybe praecox</i> | <i>Agrocybe molesta</i> |
|----------------------------------------|-------------------------------------|
| Chapeau plus nettement coloré | Chapeau très pâle |
| Anneau vite sous forme d'une mince | Anneau en forme de cortine filamen- |
| Saveur assez désagréable ou amares- | Saveur totalement douce. |
| Rhizoïdes mycéliens toujours présents. | Rhizoïdes mycéliens généralement |

Vérfifié le 23 mai 2013