

TRICHOLOMA SCALPTURATUM

Nom de référence : *Tricholoma scalpturatum* Quél.

Synonymes : *Tricholoma argyraceum* var. *chysites* (Jungh.) Gillet
Tricholoma chysitis (Jungh.) Quél.

Classification : Division : Basidiomycota
Ordre : Agaricales
Famille : Tricholomataceae

Nom français : tricholome sculpté, tricholome jaunissant, tricholome gravé.

Intérêt culinaire : comestible.



Photo : André Lantz



Photo : Michel Javayon



Photo : Annette Jacquet

1-DESCRIPTION

- 1-1 Silhouette** : à terre, de dimension moyenne, avec un pied surmonté d'un chapeau étalé et légèrement mamelonné. Couleur dominante : gris brun pâle.
- 1-2 Chapeau** : De 2 à 8 cm. Convexe au début, plus ou moins mamelonné, il ne tarde pas à s'aplanir et même à se creuser. Le revêtement est sec, fibrilleux radialement et feutré-écailleux concentriquement avec de fines squamules-écailles de plus en plus denses en se rapprochant du centre (loupe), sa couleur du fond est crème devenant jaunâtre en vieillissant, les fibrilles et les squames sont gris brun avec parfois des nuances lilas. La marge est unie, mince, elle reste longtemps incurvée et devient jaune avant le reste du revêtement.
- 1-3 Pied ou stipe** : de 3-6 x 0,5-1 cm, il est central et cylindrique, plein puis farci. Sa surface blanchâtre ou grisâtre pâle est plus ou moins fibrilleuse, elle peut être munie de restes de cortine visible uniquement sur les très jeunes (loupe), elle jaunit avec l'âge.
- 1-4 Chair** : assez peu épaisse, fibreuse, blanche, jaunissant très lentement après la coupe, elle dégage une saveur douce et une odeur nettement farineuses.
- 1-5 Lames** : échancrées à l'insertion sur le pied, elles sont serrées, sinuées, larges, peu serrées, de couleur blanchâtre à grisâtre pâle, elles jaunissent à partir de la marge du chapeau dans les endroits meurtris mais le jaunissement ne se voit bien que sur les exemplaires anciens. L'arête est concolore à la face des lames, elle est lisse à finement crénelée (loupe).
- 1-6 Sporée** : blanche.
- 1-7 Habitat** : de l'été à la fin de l'automne, dans les bois mêlés de feuillus ou plus rarement de résineux, les parcs, les bords de chemin, les sous-bois, avec une prédilection pour les sols calcaires.
- 1-8 Répartition** : champignon très répandu, souvent en colonie de nombreux individus en plaine et en montagne.

2-OBSERVATIONS

Ce champignon vient généralement en groupe, avec l'âge le jaunissement des lames apparaît avant celui du revêtement du chapeau ou celui de la surface du pied, il sera donc préférable d'observer les lames sur de vieux exemplaires.

3-INTERÊT

Comestible agréable.

4-RISQUES DE CONFUSION

Avec les autres tricholomes groupe des « tricholomes terreux » (sous-section *Terreineae*) dont il fait partie, une confusion dans ce groupe ne porte pas à conséquences car ils sont toutes les espèces sont comestibles. Attention au tricholome tigré qui est très toxique, mais ce dernier est plus massif et ne fréquente pas le même habitat.

Il existe différentes variétés de cette espèce.

Vérfié le 23 janvier 2014