

MYCENA LEPTOCEPHALA

Nom de référence : *Mycena leptocephala* (Pers.) Gillet

Synonymes : *Mycena alcalina* var. *chlorinella* J.E. Lange
Mycena chlorinella Pers.

Classification : **Division** : Basidiomycota
Ordre : Agaricales
Famille : Mycenaceae

Nom français : mycène à chair mince, mycène à chapeau mince.

Intérêt culinaire : petite espèce ne présentant aucun intérêt culinaire, mais sans toxicité remarquée.



1-DESCRIPTION

1-1 Silhouette : au sol, de petite dimension avec un chapeau campanulé surmontant un pied fin. Couleur dominante : gris à brun sombre.

1-2 Chapeau : de 1 à 2 cm, en forme de cloche et parfois mamelonné, il est un peu hygrophane. Le revêtement est prumineux (loupe), strié, il est de couleur brun-gris à gris clair avec souvent des reflets bleutés. La marge fine et striée est plus pâle que le revêtement.

1-3 Pied ou stipe : 2,5-7 X 0,1-0,3 cm. Cylindrique, lisse, fragile, mat, il est plein puis creux avec l'âge, sa base est épaissie puis un peu radicante et porte des rhizoïdes blancs. Sa surface est concolore au revêtement du chapeau mais plus pâle au sommet où elle prineuse (loupe).

1-4 Chair : mince, fragile, blanchâtre à gris pâle, avec une odeur d'eau de javel et saveur douce à raphanoïde.

1-5 Lames: ascendantes ou adnées à l'insertion sur le pied, elles sont larges, espacées et de couleur blanc-grisâtre. L'arête est fine, entière ou finement denticulée (loupe) et de couleur plus pâle que la face des lames.

1-6 Sporée : crème-blanchâtre.

1-7 Habitat : cette espèce plutôt grégaire est commune dans les bois de conifères, elle est rare sous feuillus. On la trouve du début de l'été jusqu'à la fin de l'automne.

1-8 Répartition : espèce assez répandue en plaine et en montagne.

2-OBSERVATIONS

3-INTERÊT

Aucun.

4-RISQUES DE CONFUSION

Avec *Mycena stipata* et aussi les autres mycènes à odeur de chlore, cette odeur est un marqueur important pour les identifications.

Vérfié en séance le 6 février 2014