

LACTARIUS CAMPHORATUS

Nom de référence : *Lactarius camphoratus*(Bull.) Fr.

Synonymes : *Agaricus subdulcis* var. *camphoratus* (Bull.) Fr.

Lactifluus camphoratus (Bull.) Kuntze

Classification : **Division** : Basidiomycota

Ordre : Russulales

Famille : Russulaceae

Nom français : lactaire camphré, lactaire à odeur de chicorée.

Intérêt culinaire : aucun intérêt culinaire.



1-DESCRIPTION

1-1 Silhouette : au sol, champignon de taille moyenne à pied central surmonté d'un chapeau plat ou déprimé. Couleur dominante : brun-roux foncé.

1-2 Chapeau : de 2 à 5 cm de diamètre, il est convexe au début puis aplati et se creuse un peu avec l'âge ; il conserve souvent un petit mamelon central. Le revêtement adhérent, vite sec et mate, est à peine rugueux mais marqué de petites rides près du disque central ; sa couleur est brun-rougeâtre, encore plus foncée au centre mais un peu plus pâle vers l'extérieur. La marge, enroulée au début, est mince, lisse ou légèrement cannelée.

1-3 Pied ou stipe : 2,5-6 x 0,5-1 cm, il est cylindrique, farci puis creux, cassant comme un bâton de craie. Sa surface, pruineuse de blanchâtre dans la jeunesse, est brun rosé en haut, plus sombre au centre et devient vineuse tout en bas.

1-4 Chair : beige-roussâtre, elle est brun-rouge sous le revêtement du chapeau. Elle présente une odeur complexe de chicorée, de bouillon KUB, de réglisse, de punaise chez le champignon frais ; l'odeur de chicorée devient plus forte après dessiccation. La saveur est douce et un peu astringente. Le lait, abondant chez les jeunes exemplaires, de couleur blanc aqueux, est immuable.

1-5 Lames : largement adnées à subdécurrentes à l'insertion sur le pied, elles sont serrées, quelques-unes sont fourchues à proximité du pied ; elles sont de couleur ocre rosâtre, puis brune avec des reflets rouge vineux avec l'âge. Présence de lamelles et lamellules. L'arête est lisse, mince, plus pâle que la face des lames.

1-6 Sporée : crème-blanchâtre.

1-7 Habitat : sous bois mêlés ou conifères de juin à octobre ; sur sol plus ou moins acide.

1-8 Répartition : grégaire, espèce commune en montagne et en plaine.

2-OBSERVATIONS

3-INTERÊT

Aucun intérêt culinaire. Certains fumeurs de pipe mélangent des fragments de ce champignon à leur tabac !

4-RISQUES DE CONFUSION

On peut confondre le lactaire camphré avec *Lactarius tabidus*, *Lactarius quietus*, *Lactarius decipiens*, *Lactarius hepaticus*, etc.

Vérfié le 23 mars 2014