

## PSATHYRELLA CANDOLLEANA

**Nom de référence** : *Psathyrella candolleana* (Fr.) Maire

**Synonymes** : *Psathyra candolleana* (Fr.) G. Bertrand  
*Drosophila candolleana* (Fr.) Quél.

**Classification** : **Division** : Basidiomycota  
**Ordre** : Agaricales  
**Famille** : Psathyrellaceae

**Nom français** : psathyrelle de De candolle, hypholome de De candolle.

**Intérêt culinaire** : espèce comestible mais peu charnue.



## 1-DESCRIPTION

- 1-1 Silhouette** : au sol, souvent en relation avec du bois (visible ou enfoui) ; de dimension faible à moyenne avec un pied surmonté d'un chapeau convexe à plat.  
Couleur dominante : brun jaune pâle, encore plus pâle par temps sec.
- 1-2 Chapeau** : jusqu'à 7 cm diamètre. Il évolue de campanulé à convexe, à aplani. Le revêtement, marqué de petites rides radiales, est de couleur jaune-ochracé pâle par temps humide alors qu'il est crème-blanchâtre par temps sec, le centre étant généralement ochracé pâle. Le centre du chapeau porte souvent des débris du voile sous forme de flocons brunâtres (loupe), ils peuvent disparaître avec l'âge et la pluie. La marge est fine, elle est appendiculée de lambeaux blanchâtres dans la jeunesse.
- 1-3 Pied ou stipe** : 4-8 X 0,3-0,8 cm. Cylindrique, parfois un peu clavé, fragile, il est plein puis creux dans la vétusté. Sa surface est lisse, brillante, blanche d'apparence argentée, plus ou moins marbrée, elle est pruineuse et fibrilleuse longitudinalement au sommet. Il porte souvent une trace annulaire provenant des restes du voile passant souvent inaperçue.
- 1-4 Chair** : peu épaisse, fragile, cassante, blanchâtre à crème, immuable, elle offre une saveur douce et une odeur faible.
- 1-5 Lames** : adnées à échanquées à l'insertion sur le pied, elles sont larges, assez serrées, de couleur blanche puis grisâtre teinté de violet et enfin brun-pourpre. Présence de lamelles et de lamellules. L'arête est finement dentée et reste blanche (loupe).
- 1-6 Sporée** : brun-pourpre foncé.
- 1-7 Habitat** : espèce commune plus ou moins cespiteuse, elle pousse dans les forêts, parcs, jardins, stations herbeuses, du début du printemps jusqu'à l'automne.
- 1-8 Répartition** : espèce ubiquiste très commune en plaine et en montagne.

## 2-OBSERVATIONS

Ce champignon est hygrophane.

## 3-INTERÊT

Espèce comestible mais trop peu charnue pour être consommée.

## 4-RISQUES DE CONFUSION

Quelques psathyrelles et aussi *Coprinopsis marcescibilis* (= *Psathyrella marescibilis*).

**Vérfié en séance le 27 mars 2014**