

## RHODOCOLLYBIA BUTYRACEA

**Nom de référence** : *Rhodocollybia butyracea* (Bull.) Lennox

**Synonymes** : *Collybia butyracea* (Bull.) P. Kumm.

*Agaricus butyraceus* Bull.

**Classification** : **Division** : Basidiomycota

**Ordre** : Agaricales

**Famille** : Marasmiaceae

**Nom français** : collybie beurrée, collybie savonneuse.

**Intérêt culinaire** : à rejeter.



Photo : Michel Javayon



Photo : Michel Javayon

## **1-DESCRIPTION**

- 1-1 Silhouette** : au sol, de petite à moyenne dimension avec un pied central surmonté d'un chapeau convexe à étalé. Couleur dominante : beige à un brun foncé.
- 1-2 Chapeau** : de 3 à 7,5 cm, il est convexe puis étalé et conserve un mamelon central. Le revêtement est nu, humide, gras (aspect beurré : test du baiser) et brillant, il est de couleur variable, le centre est brun-noirâtre, ailleurs il est brun-beige ou brun-rougeâtre. Ce champignon étant hygrophane le revêtement peut présenter des zones concentriques foncées et d'autres plus claires. La marge, de couleur crème à ochracé clair est relevée sur les exemplaires très âgés.
- 1-3 Pied ou stipe** : 4-7 X 0,5-2 cm, cylindrique, vite creux, renflée à la base, il est de consistance élastique, cartilagineuse, vite flasque. Sa surface est longuement sillonnée, parfois floconneuse puis vite lisse, à la base elle est couverte d'un feutre mycélien blanc. Cette surface est de couleur beige ochracé, parfois un peu beige rosâtre mais en général sa couleur rappelle celle du revêtement du chapeau.
- 1-4 Chair** : blanche à gris hyalin mais brune sous le revêtement du chapeau, elle est flasque, molle, mince. L'odeur est faible, la saveur est douce.
- 1-5 Lames** : ascendantes à presque libres ou échancrées à l'insertion sur le pied, serrées, elles sont de couleur blanche puis crème pâle. Présence de lamelles et lamellules. L'arête est crénelée sur certaines formes de cette espèce.
- 1-6 Sporée** : elle est de couleur crème à peine teintée de rose pâle.
- 1-7 Habitat** : principalement en été et en automne, dans les bois de feuillus et de conifères, plutôt sur sol pauvre et acide.
- 1-8 Répartition** : à terre, espèce très fréquente de la plaine à l'étage montagnard.

## **2-OBSERVATIONS**

Une caractéristique assez constante des genres *Rhodocollybia*, *Gymnopus* et proches est la consistance cartilagineuse et élastique de la chair, elle est particulièrement ressentie dans le pied. En serrant modérément celui-ci entre le pouce et l'index on a l'impression de serrer un fin tuyau de caoutchouc.

## **3-INTERÊT**

Aucun intérêt culinaire à cause de sa consistance.

## **4-RISQUES DE CONFUSION**

*Rhodocollybia proluxa* lui ressemble mais son chapeau n'est pas « beurré ». Il existe *Rhodocollybia butyracea* var. *asema* qui a un chapeau jaunâtre pâle.

**Vérfié en séance le 3 avril 2014**