

MEGACOLLYBIA PLATYPHYLLA

Nom scientifique correct : *Megacollybia platyphylla* (Pers.) Kotl. & Pouzar

Synonymes : *Collybia platyphylla* (Pers.) P. Kumm.
Collybia grammocephala (Bull.) Qué.

Classification : **Division :** Basidiomycota
Ordre : Agaricales
Famille : Tricholomataceae

Nom français : collybie à lames larges, collybie à larges feuillets, collybie à chapeau rayé.

Intérêt culinaire : l'amertume de sa chair et sa consistance coriace l'éloignent de tout intérêt culinaire.



1-DESCRIPTION

- 1-1 Silhouette** : au sol ou sur souche, de dimension moyenne à grande, avec un pied surmonté d'un chapeau vite aplani. Couleur dominante : gris-brunâtre.
- 1-2 Chapeau** : Jusqu'à 14/15 cm de diamètre, il évolue de convexe à rapidement aplani et porte souvent un petit mamelon central. Le revêtement de couleur brun-gris plus ou moins sombre ou olivâtre est typiquement vergeté de nettes fibrilles radiales gris foncé. La marge est concolore au revêtement, fine, enroulée dans la jeunesse, elle est lisse, excédante et a tendance à se fendre avec l'âge.
- 1-3 Pied ou stipe** : 4-15 X 1-2,5 cm. Cylindrique, fibrilleux et vite creux, il est d'abord assez court et un peu clavé, il s'allonge en vieillissant jusqu'à donner un port élancé. Sa surface, finement floconneuse de blanc au sommet (loupe), est de couleur blanchâtre au début, devient gris-brunâtre par les fibrilles longitudinales qui la recouvrent, mais la base reste plus claire et présente un important réseau de gros cordons mycéliens blancs ramifiés.
- 1-4 Chair** : blanchâtre, mince, molle et fibreuse. Elle dégage une odeur faible et présente une saveur douce ou amarescente.
- 1-5 Lames** : adnées à échanquées ou même faiblement décurrentes à l'insertion sur le pied, elles sont larges, peu serrées, de couleur blanche se teintant de beige à brun clair avec l'âge. Présence de lamelles et lamellules. L'arête est concolore et denticulée.
- 1-6 Sporée** : blanche.
- 1-7 Habitat** : toujours en relation avec du bois ou sur sol saturé de débris ligneux, cette espèce a une prédilection pour les bois de feuillus de la fin du printemps à la fin de l'automne.
- 1-8 Répartition** : espèce très courante en plaine et en montagne.

2-OBSERVATIONS

3-INTERÊT

Non comestible, susceptible de créer des indispositions.

4-RISQUES DE CONFUSION :

Ressemblance avec l'*Inocybe maculé* (toxique). On rapporte des incidents imputables à *Megacollybia platyphylla* consommée en grande quantité. Il est donc sage d'éloigner cette espèce de toute consommation.

Vérfié le 10 avril 2014