

LACTARIUS LACUNARUM

Nom de référence : *Lactarius lacunarum* (Romagn) Hora

Synonymes : *Lactarius decipiens* var. *lacunarum* Romagn.

Lactarius lacunarum (Romagn.) J.E. Lange

Classification : **Division** : Basidiomycota

Ordre : Russulales

Famille : Russulaceae

Nom français : lactaire des borbiers, lactaire des ornières.

Intérêt culinaire : sans valeur culinaire.



1-DESCRIPTION

Silhouette : au sol, de taille petite à moyenne, avec un pied surmonté d'un chapeau convexe. Couleur dominante : brun orangé à brun-rougeâtre.

Chapeau : 1,5 à 6 cm, d'abord convexe, plus ou moins mamelonné, il est ensuite étalé à déprimé. Le revêtement, sec, lisse à très finement granuleux, est de couleur brun-jaunâtre, brun orange jusqu'à brun-rougeâtre, il est parfois guttulé. La marge, mince, unie ou un peu striée, est légèrement pruinuse (loupe), régulière et longtemps incurvée, elle peut paraître translucide tout au bord.

Pied ou stipe : 2-6 x 0,3-1 cm, cylindrique, à peine atténué de haut en bas, il est plein puis farci et enfin creux. Sa surface est de couleur crème orangé en haut et brun orangé à brun-rougeâtre vers la base ; au sommet elle est marquée par les filets des lames. La base est feutrée de blanc puis de roux.

Chair : fragile, tendre, de couleur crème à ochracé rosâtre, avec un lait blanc qui jaunit lentement sur les lames mais plus rapidement sur le mouchoir. La saveur de la chair et du lait d'abord douce devient âcre, l'odeur douce est légèrement fruitée.

Lames : adnées à subdécurrentes et se prolongeant en filet sur le haut du pied, peu fourchues, elles sont assez serrées et de couleur blanchâtre puis crème orangé se tachant de roussâtre. Des lamelles et lamellules sont présentes. L'arête est aiguë, entière, concolore à la face des lames dans sa jeunesse puis rougissant un peu.

Sporée : blanchâtre à peine teintée de rose.

Habitat : d'août à octobre, en groupe sous peupliers, aulnes, saules,...dans des lieux sablonneux humides ou régulièrement inondés (fossés, bord des mares, ornières...).

Répartition : de la plaine à l'étage montagnard.

2-OBSERVATIONS

On peut trouver ce champignon en grande quantité au fond d'un fossé bordé de peupliers par exemple.
Seuls les lactaires à lait rouge ou carotte sont consommables.

3-INTERÊT

Non comestible.

4-RISQUES DE CONFUSION

Il peut être confondu avec le lactaire chiffonné (*Lactarius tabidus*) qui a un chapeau plus pâle et finement ridé.

Vérifié le 21 août 2014