

LECCINELLUM CROCIPODIUM

Nom de référence : *Leccinellum crocipodium* (Letell.) Del. Mag. & Tras.

Synonymes : *Leccinum crocipodium* (Letell.) Watling

Leccinum nigriscens (Singer) Bresin. & Manfr. Binder

Classification : Division : Basidiomycota

Ordre : Boletales

Famille : Boletaceae

Nom français : bolet craquelé, bolet rude à pied jaune safran.

Intérêt culinaire : médiocre comestible.



1-DESCRIPTION

1-1 Silhouette : au sol, de dimension moyenne à grande avec un pied central surmonté d'un chapeau convexe. Couleur dominante : jaunâtre.

1-2 Chapeau : de 5 à 15 cm. Il est hémisphérique puis convexe à aplani. Le revêtement, mat, feutré, velouté, de couleur jaune citron chez le jeune sujet puis jaune-brunâtre et enfin brun plus soutenu, est assez vite craquelé ou tessellé. La marge lisse, d'abord plus pâle puis concolore au revêtement, est débordante sur-tout chez les jeunes spécimens.

1-3 Pied ou stipe : de 6-15 x 1,5-5 cm. Cylindrique, un peu renflé en bas (clavé) ou légèrement ventru, il est souvent subradicant. Le pied est plein et assez ferme dans la jeunesse. Sa surface rugueuse, est garnie de squamules ou aspérités longitudinales jaunes au début mais fonçant avec l'âge et devenant même brun-rougeâtre sur le tard, ces rugosités forment un vague réticule en bas du pied. La couleur dominante de cette surface reste jaunâtre.

1-4 Chair : épaisse, ferme puis molle, elle est spongieuse avec l'âge. Dans le chapeau elle est crème blanchâtre ou jaune pâle mais plus franchement jaune sous le revêtement du chapeau ; cette couleur devient rougeâtre puis brunâtre et enfin noirâtre après la coupe. Dans le pied la chair est fibreuse, concolore à celle du chapeau. La saveur est douce, à peine acidulée, l'odeur est faible.

1-5 Tubes et pores : les tubes sont facilement séparables de la chair du chapeau. Ascendants, échancrés, à l'insertion sur le pied, ils sont de couleur jaune puis gris-jaunâtre plus ou moins lavé d'olivâtre, ils brunissent après la coupe et au frottement. Les pores sont arrondis (0,6 à 1mm de diamètre), plutôt fins et concolores aux tubes.

1-6 Sporée : brun tabac olivâtre.

1-7 Habitat : sous les chênes, les hêtres, les charmes mêlés ou sous d'autres feuillus, d'août à novembre.

1-7 Répartition : espèce commune en plaine et en montagne.

2-OBSERVATIONS

Le genre *Leccinum* (tout comme le genre *Leccinellum*) se distingue par son chapeau peu ou non visqueux et son pied élancé, raboteux, rugueux car couvert d'aspérités en relief.

Le genre *Leccinum* comporte beaucoup d'espèces. Pour les déterminer, il faut attacher une grande importance au biotope, aux couleurs (dont celles des aspérités du pied) et à leurs variations.

Des variétés et formes de cette espèce ont été décrites.

3-INTERÊT

Comestible d'assez médiocre qualité, rejeter les exemplaires âgés.

4-RISQUES DE CONFUSION

Leccinum lepium, *Leccinum corsicum*, etc. Le revêtement craquelé et le pied jaune devraient suffire à éviter les confusions.

Vérifié le 11 septembre 2014