

LECCINUM PSEUDOSCABRUM

Nom de référence : *Leccinum pseudoscabrum* (Kalleenb.) Sutara

Synonymes : *Leccinum carpini* (R. Schulzer) M.M. Moser ex D.A. Reid
Krombolziella carpini (R. Schulzer) Bon

Classification : **Division** : Basidiomycota
Ordre : Boletales
Famille : Boletaceae

Nom français : bolet des charmes, bolet rude des charmes.

Intérêt culinaire : médiocre comestible.



1-DESCRIPTION

1-1 Silhouette : au sol, de dimension moyenne à grande avec un long pied central surmonté d'un chapeau convexe. Couleur dominante : brun.

1-2 Chapeau : de 5 à 12 cm. Il est hémisphérique puis convexe à aplani. Le revêtement, lubrifié par temps humide, est mat, un peu feutré, lisse, toujours marqué de petits creux, fossettes et bosses qui lui donnent un aspect légèrement cabossé, parfois fendillé par temps sec. Il est de couleur brun clair à brun foncé, parfois teinté de verdâtre ou de jaunâtre. La marge lisse, épaisse, débordante, en bourrelet, reste concolore au revêtement.

1-3 Pied ou stipe : de 6-15 x 1,5-3,5 cm. Assez nettement ventru mais pas obèse, cylindrique plus tard, il est plein et son cortex est ferme. Sa surface crème-blanchâtre, gris-jaunâtre devient brun-grisâtre foncé ; elle est marquée de stries longitudinales tout en haut et porte sur toute sa longueur des squamules/aspérités/rugosités alignées ou en réseau de couleur gris sombre à noirâtre plus clairsemées dans la partie supérieure ; la base est parfois tachée de bleu-vert.

1-4 Chair : épaisse, ferme mais vite molle et spongieuse dans le chapeau, elle est blanche mais vire au rougeâtre puis au violet sombre et finalement au noir après la coupe. Dans le pied elle est fibreuse, également de couleur blanche mais parfois bleutée en bas du pied ; après la coupe elle vire au rougeâtre puis au violet-noir. La saveur est douce ou un peu acidulée et l'odeur est faible.

1-5 Tubes et pores : les tubes sont facilement séparables de la chair du chapeau. Nettement ascendants, échançrés à l'insertion sur le pied, ils sont de couleur crème-blanchâtre puis gris-jaunâtre et enfin gris-brunâtre, virant au violet-noirâtre au frottement. Les pores sont arrondis, plutôt fins (de 2 à 3 par mm) et concolores aux tubes.

1-6 Sporée : brun tabac olivâtre.

1-7 Habitat : essentiellement sous charmes, plus rare sous d'autres feuillus, d'août à novembre.

1-8 Répartition : espèce très commune.

2-OBSERVATIONS

Le genre *Leccinum* (tout comme le genre *Leccinellum*) se distingue par son chapeau peu ou non visqueux et son pied élancé, raboteux, rugueux car couvert d'aspérités en relief.

Le genre *Leccinum* comporte beaucoup d'espèces. Pour les déterminer, il faut attacher une grande importance au biotope, aux couleurs (dont celles des aspérités du pied) et à leurs variations.

Des variétés et formes de cette espèce ont été décrites.

3-INTERÊT

Comestible de bien médiocre qualité, rejeter les exemplaires âgés.

4-RISQUES DE CONFUSION

Leccinum scabrum, *Leccinum duriusculum*, etc. Identifier les arbres proches est indispensable pour reconnaître un *Leccinum*.

Vérfié le 11 septembre 2014