

LECCINUM VARIICOLOR

Nom de référence : *Leccinum variicolor* Watling

Synonymes : *Krombholziella oxydabilis* (Singer) Sutara
Boletus variicolor (Watling) Hlavacek

Classification : **Division** : Basidiomycota
Ordre : Boletales
Famille : Boletaceae

Nom français : bolet ramoneur.

Intérêt culinaire : médiocre comestible.



Photo Wikimedia

1-DESCRIPTION

1-1 Silhouette : au sol, de dimension moyenne à grande avec un pied central surmonté d'un chapeau convexe. Couleur dominante : gris-noir.

1-2 Chapeau : de 5 à 12 cm. Il est hémisphérique puis convexe à aplani. Le revêtement, lubrifié par temps humide est mat, un peu feutré, lisse ; de couleur gris-brunâtre à brun-noirâtre, comme couvert de suie, il est maculé de plaques pâles ce qui lui donne un aspect marbré. La marge est lisse, épaisse non débordante et concolore au revêtement.

1-3 Pied ou stipe : de 6-15 x 1,5-2-3 cm. Cylindrique à fusiforme ou clavé, il est plein. Sa surface blanche porte des squamules/aspérités/rugosités de couleur gris sombre à noirâtre formant un vague réseau, ces rugosités sont plus clairsemées dans la partie supérieure du pied alors que la base est parfois tachée de bleu-vert ou de vert-jaunâtre.

1-4 Chair : dans le chapeau elle est assez épaisse, ferme mais vite molle et spongieuse, elle est blanche mais vire au rosâtre après la coupe. Dans le pied elle est ferme, fibreuse et également blanche mais souvent bleuâtre ou vert-jaunâtre tout en bas du pied, après la coupe elle vire également au rosâtre mais se teinte plus nettement de bleu ou de vert-jaunâtre à la base. La saveur est douce, l'odeur est faible.

1-5 Tubes et pores : les tubes sont facilement séparables de la chair du chapeau. Echancrés à l'insertion sur le pied, longtemps de couleur blanchâtre virant au rose ochracé puis au brun en vieillissant, ils brunissent au frottement. Les pores sont arrondis, plutôt fins et concolores aux tubes.

1-6 Sporée : brun tabac olivâtre.

1-7 Habitat : essentiellement sous bouleaux, rare sous d'autres feuillus, d'août à novembre.

1-8 Répartition : espèce très commune.

2-OBSERVATIONS

Le genre *Leccinum* (tout comme le genre *Leccinellum*) se distingue par son chapeau peu ou non visqueux et son pied élancé, raboteux, rugueux car couvert d'aspérités en relief.

Le genre *Leccinum* comporte beaucoup d'espèces. Pour les déterminer, il faut attacher une grande importance au biotope, aux couleurs (dont celles des aspérités du pied) et à leurs variations.

Le chapeau de cette espèce est « comme couvert de suie », d'où le nom de bolet ramoneur.

3-INTERÊT

Comestible de bien médiocre qualité, rejeter les exemplaires âgés.

4-RISQUES DE CONFUSION

Leccinum scabrum, *Leccinum pseudoscabrum*, etc. Identifier les arbres proches est indispensable pour reconnaître un *Leccinum*.

Vérfifié le 29 septembre 2014