

## AMANITA LIVIDOPALLESCENS

**Nom de référence :** *Amanita lividopallescens* (Secr. ex Gillet) Seyot

**Synonymes :** *Amanita vaginata* var. *lividopallescens* Gillet  
*Amanitopsis simulans* Contu

**Classification :** Division : Basidiomycota  
Ordre : Agaricales  
Famille : Amanitaceae

**Nom français :** aucun.

**Intérêt culinaire :** non comestible.



## 1-DESCRIPTION

**1-1 Silhouette** : au sol, de dimension moyenne avec un chapeau convexe surmontant un pied. Couleur dominante : beige.

**1-2 Chapeau** : de 4 à 12 cm de diamètre, hémisphérique devenant convexe à conique puis s'aplatissant avec une légère dépression en zone centrale, il est un peu mamelonné. Le revêtement est lisse, brillant ou mat, parfois un peu lubrifié, il est de couleurs variables mais toujours pâles : blanc crème, grisâtre, gris-beige, gris-ochracé clair. Le revêtement est normalement nu mais il peut parfois présenter un lambeau blanc reste du voile général. La marge, est fine, régulière, longuement striée et concolore au revêtement ou un peu plus pâle, cependant chez quelques exemplaires la marge peut présenter de petits lambeaux qui sont les restes du voile partiel.

**1-3 Pied ou stipe** : de 4-15 (20) x 1,5-3 cm, il est farci puis creux, cylindrique, à peine dilaté à la base, long. Sa surface est blanche, lisse, finement floconneuse (loupe) puis présente dans sa partie inférieure une bande horizontale squamuleuse un peu colorée de crème-ochracé ou concolore au revêtement du chapeau, cette bande prenant l'aspect d'une zone annulaire. Sa base est enfermée dans une volve persistante, membraneuse et longuement engainante, cependant cette volve est fragile, elle est blanche à l'extérieur, mais l'intérieur est crème blanchâtre parfois lavée d'ochracé clair.

**1-4 Chair** : peu épaisse, ferme au début mais devenant vite molle, elle est blanche à crème. Sa saveur est douceâtre, un peu rance, son odeur est faible.

**1-5 Lames** : les lames sont libres à l'insertion sur le pied, ventruées, assez serrées, de couleur blanche à crème. Les lamelles et les lamellules sont tronquées. L'arête est denticulée, plus ou moins floconneuse et concolore à la face des lames.

**1-6 Sporée** : blanche.

**1-7 Habitat** : en lisière ou dans les clairières sous les feuillus (chênes, charmes...) en été et en automne, cette espèce préfère les terrains basico-calcaires.

**1-8 Répartition** : ce champignon n'est pas commun en plaine comme en altitude.

## 2-OBSERVATIONS

Certains auteurs distinguent *Amanita lividopallescens* de *Amanita simulans*.

Cette amanite appartient au sous-genre *Amanitopsis* qui se caractérise par la marge striée du chapeau, un pied sans anneau et une volve engainante. Comme pour toutes les amanites à volve, il est indispensable de passer la lame d'un fort couteau sous le pied afin de déterrer le champignon sans laisser la volve enfouie dans la terre.

## 3-INTERÊT

Espèce toxique crue. Comestible médiocre bien cuite, cette espèce est trop peu charnue pour mériter les honneurs de la table, de plus elle peut donc s'avérer toxique.

## 4-RISQUES DE CONFUSION

Cette amanite peut être confondue avec l'amanite de Maire (*Amanita mairei*) mais aussi avec *Amanita separata* et *Amanita fraudulenta*.

**Vérfié le 16 octobre 2014**