

AMANITA CECILIAE

Nom de référence : *Amanita ceciliae* (Berk & Broome) Bas

Synonymes : *Amanita strangulata* var. *royeri* (L. Maire) Contu
Amanita inaurata Secr.)

Classification : **Division** : Basidiomycota

Ordre : Agaricales

Famille : Amanitaceae

Nom français : amanite impériale, amanite ceinturée, amanite étranglée.

Intérêt culinaire : comestible médiocre



Photo : René Chalange

1-DESCRIPTION

- 1-1 Silhouette** : au sol, de dimension moyenne à grande avec un pied central surmonté d'un chapeau ovoïde à convexe. Couleur dominante : ocre olivâtre.
- 1-2 Chapeau** : 8 à 15 (25) cm de diamètre, ovoïde dans la jeunesse devenant convexe puis s'aplatissant, il apparaît strié par transparence sur environ ¼ du rayon. Le revêtement mat à soyeux, brillant par temps sec, un peu visqueux à collant par temps humide (test du baiser) est de couleur jaune-brunâtre, brun-rougeâtre à gris-brunâtre, plus foncé vers le centre. Il est recouvert de plaques gris-blanc sale, restes du voile, brunissant avec l'âge. La marge est fine et fortement striée.
- 1-3 Pied ou stipe** : 12-20 X 2-4 cm, cassant, cylindrique, élancé, épaissi vers la base, il est plein puis devient creux en vieillissant. Sa surface blanchâtre est finement pruineuse au sommet (loupe); la base ne possède pas de volve vraiment engainante mais une volve fragile qui laisse de nets bourrelets grisâtres ceinturant le bas du pied. Au-dessus des bourrelets le pied est orné de flocons blanc sale à grisâtres mais il ne possède pas d'anneau.
- 1-4 Chair** : mince, tendre, blanche. Saveur douce de noisette. Odeur nulle.
- 1-5 Lames** : libres à l'insertion sur le pied, elles sont blanches, légèrement brunâtres avec l'âge et assez serrées. Présence de lamelles et de lamellules. L'arête est floconneuse.
- 1-6 Sporée** : blanche.
- 1-7 Habitat** : de fin juin à octobre, sous feuillus et conifères.
- 1-8 Répartition** : espèce peu fréquente en plaine mais encore plus rare à l'étage montagnard, sur sol calcaire et argileux.

2-OBSERVATIONS

Cette amanite appartient au sous-genre *Amanitopsis* qui se caractérise par la marge striée du chapeau et un pied possédant une volve mais pas d'anneau.

3-INTERÊT

Comestible mais doit être bien cuite, peu recommandable.

4-RISQUES DE CONFUSION

Cette amanite peut être confondue avec *Amanita battarrae* et *Amanita submembranacea*

Vérfié le 21 novembre 2014