

STEREUM SUBTOMENTOSUM

Nom de référence : *Stereum subtomentosum* Pouzar

Synonymes : *Stereum ochtoleucum* subsp. *articum* Fr.
Auricularia reflexa Bull.

Classification : **Division** : Basidiomycota
Ordre : Russulales
Famille : Stereaceae

Nom français : stérée subtomenteuse.

Intérêt : non comestible.



1-DESCRIPTION

- 1-1 Silhouette** : sur bois mort, de taille moyenne les champignons sont étagés ou alignés, ils sont étalés en éventail greffé sur le support. Couleur dominante : gris orange.
- 1-2 Chapeau ou réceptacle** : de 1 à 7 cm de diamètre pour une épaisseur de 0,2 à 0,6 mm, les chapeaux, plus ou moins confluent et imbriqués, sont groupés en ligne ou étagés. Ils sont ondulés, réfléchis, étalés en éventail sur le support, les bords étant nettement relevés. La face supérieure, peu densément feutrée (loupe) dans la jeunesse est presque glabre avec l'âge ; elle est ornée de zones concentriques crème, jaune-ocre, gris orange, ou grisâtres et est bien souvent marquée de vert par de minuscules algues. La marge est ondulée, plus claire à blanche.
- 1-3 Pied ou stipe** : inexistant si le champignon vient sur un support horizontal, très réduit si le support est vertical.
- 1-4 Chair** : extrêmement mince (0,5 mm) elle est tenace et élastique à l'état frais puis coriace et rigide à l'état sec, crème-blanchâtre. La saveur et l'odeur sont celles des champignons, bien qu'un peu acidulées.
- 1-5 Tubes/pores** : inexistant car la face fertile, située à la face inférieure du réceptacle, est lisse mais un peu bosselée, ondulée, elle ne présente donc ni lames, ni tubes/pores, ni aiguillons. Cette face inférieure est de couleur jaunâtre à jaune orangé qui se renforce au frottement mais elle grisonne avec la sécheresse.
- 1-6 Sporée** : blanchâtre.
- 1-7 Habitat** : en troupe serrée toute l'année sur billes et branches de bois mort de feuillus, surtout de saules, aulnes, hêtres, ...plus fréquent dans les milieux humides.
- 1-8 Répartition** : ce champignon est très commun en plaine et en montagne toute l'année.

2-OBSERVATIONS

3-INTERÊT

Aucun.

4-RISQUES DE CONFUSION

Il faudra être très attentif et observer l'ensemble des caractères, dont certains à la loupe, pour distinguer *Stereum subtomentosum* parmi tous les champignons dimidiés ou résupinés à hyménium lisse, dont *Stereum hirsutum*.

Vérifié le 20 novembre 2014