

LYCOPERDON ECHINATUM

Nom de référence : *Lycoperdon echinatum* Pers.

Synonymes : *Lycoperdon gemmatum* var. *echinatum* (Pers.) Fr.
Lycoperdon hoylei Ber. & Broome

Classification : **Division** : Basidiomycota
Famille : Lycoperdacea

Nom français : vesse de loup hérissée.

Intérêt culinaire : aucun intérêt culinaire.



1-DESCRIPTION

1-1 Silhouette : au sol, en forme de boule recouverte d'aiguillons sur toute la surface. Couleur dominante : brun.

1-2 Chapeau : d'aspect globuleux de 4 à 6 cm de diamètre pour une hauteur d'environ 5 cm. L'enveloppe externe ou exopéridium est blanchâtre au début puis brun ochracé, brun roux et brun sombre à la fin. Sa surface est couverte d'aiguillons ou épines pouvant atteindre 5 mm qui sont aigus et incurvés, faisant penser à un hérisson. A maturité, la chute des aiguillons dans la partie supérieure laisse apparaître un pore apical.

1-3 Pied ou stipe : ce champignon ne présente pas réellement de pied au sens propre du terme mais une base courte et stérile dans la continuité de la masse globuleuse, elle est attachée au sol par des filaments mycéliens.

1-4 Chair : l'intérieur du champignon est occupé par la gléba blanche dans sa jeunesse puis brun pourpre avec l'âge et enfin pulvérulente à la fin. Dans le pseudo-pied, elle est crème ochracé pâle. Les spores sont expulsées par le pore apical.

1-5 Lames, tubes et pores, aiguillons : ce champignon n'en possède pas.

1-6 Sporée : brun rouge

1-7 Habitat : en été et en automne, en zones humides, surtout sous les hêtres parfois sous les chênes ou les épicéas ; rarement ailleurs.

1-8 Répartition : espèce assez rare.

2-OBSERVATIONS

3-INTERÊT

Aucun.

4-RISQUES DE CONFUSION

Aucun.

Vérifié le 29 janvier 2015