

PLUTEUS ROMELLII

Nom de référence : *Pluteus romellii* (Britzelm) Sacc.

Synonymes : *Pluteus lutescens* (Fr.) Bres.

Pluteus nanus var. *lutescens* (Fr.) Bres.

Classification : **Division** : Basidiomycota

Ordre : Agaricales

Famille : Pluteaceae

Nom français : plutée de Romell.

Intérêt culinaire : sans intérêt.



Photo : Annette Jacquel

1-DESCRIPTION

- 1-1 Silhouette** : au sol, de petite dimension, avec un pied central surmonté d'un chapeau convexe à aplati. Couleur dominante brun-jaune.
- 1-2 Chapeau** : de 1,5 à 5 cm. Conique-obtus au début, puis convexe restant un peu obtus, ensuite étalé légèrement mamelonné, un peu flexueux ou cabossé. Le revêtement, soyeux et mat, granuleux, quelques fois veiné-ridé ou craquelé au centre. Il est de couleur brun, brun-jaunâtre avec parfois des reflets verdâtres, le centre du chapeau est de couleur plus soutenue. La marge est un peu striée et assez souvent fendue, elle est un peu plus pâle que le revêtement.
- 1-3 Pied ou stipe** : 2-6 X 0,3-0,5 cm, cylindrique, légèrement élargi à la base, souvent coudé, plein puis farci et enfin fistuleux, fragile. Sa surface est lisse ou un peu striée longitudinalement vers la base(loupe) elle est jaune pâle dans le haut, jaune vif ou jaune de chrome dans le bas. Avec un mycélium blanc.
- 1-4 Chair** : mince, gris-jaunâtre pâle dans le chapeau mais plus nettement jaune sous le revêtement alors qu'elle est jaune vif dans le pied. La chair devient crème en séchant surtout dans le pied. Odeur faible. Saveur douce un peu raphanoïde.
- 1-5 Lames** : libres à l'insertion sur le pied, plus ou moins serrées, avec lamelles et lamellules, elles sont de couleur blanche chez le jeune champignon puis jaune rosâtre, ensuite rose jusqu'à rose foncé. L'arête est finement floconneuse, denticulée (loupe).
- 1-6 Sporée** : rose-brunâtre.
- 1-7 Habitat** : isolé à grégaire, sur bois pourri de feuillus, dans les forêts mixtes, parfois elle peut sembler terrestre mais elle est alors en relation avec des débris ligneux plus ou moins enterrés. Surtout dans les forêts humides et fraîches.
- 1-8 Répartition** : espèce moyennement fréquente. Assez précoce, on la trouve dès le mois de mai, mais elle vient jusqu'en automne.

2-OBSERVATIONS

Avec son pied jaune qui diffère nettement de la couleur du chapeau et des lames, le *Pluteus romellii* est facile à identifier.

3-INTERÊ

A rejeter.

4-RISQUES DE CONFUSION

Pluteus splendidus (Pears) est une espèce très proche, que certains mycologues considèrent comme synonyme de *Pluteus.romellii*. *Pluteus chrysophaeus* (Schaeff.) Quél. est une autre espèce assez semblable.

Vérifié le 19 février 2015