

## MARASMIELLUS RAMEALIS

**Nom de référence** : *Marasmiellus ramealis* (Bull.) Singer

**Synonymes** : *Marasmius ramealis* (Bull.) Fr.  
*Gymnopus ramealis* (Bull.) Gray

**Classification** : **Division** : Basidiomycota  
**Ordre** : Agaricales  
**Famille** : Omphalotaceae

**Nom français** : marasme des rameaux, marasme des ramilles.

**Intérêt culinaire** : trop petit.



## **1-DESCRIPTION**

**1-1 Silhouette** : en groupe sur bois, champignon de petite taille, avec un pied et un chapeau. Couleur dominante : blanc-roussâtre.

**1-2 Chapeau** : 0,3 à 1,7 cm, hémisphérique puis convexe à aplani. Son revêtement mat, finement feutré à velouté, un peu ridé est de couleur blanchâtre à ochracé-roussâtre souvent un peu plus soutenue au centre. La marge enroulée, fine, est striée jusqu'à mi rayon du chapeau par temps humide.

**1-3 Pied ou stipe** : 0,5-2 x 0,05-0,15 cm, cylindrique, arqué, il est plein et plutôt élastique. Sa surface, blanchâtre en haut, porte des flocons (loupe) ; plus bas elle est brun-roussâtre et même brun-noirâtre tout en bas.

**1-4 Chair** : blanche, insignifiante, molle. Odeur faible. Saveur légèrement amarescente.

**1-5 Lames** : adnées à l'insertion sur le pied, elles sont peu serrées, anastomosées et couleur blanchâtre à crème se teintant de rose ochracé. Présence de lamelles et de lamellules. L'arête est un peu floconneuse (loupe).

**1-6 Sporée** : blanchâtre.

**1-7 Habitat** : en été et en automne, principalement sur brindilles, branches de feuillus, plus rarement sur conifères, également sur plantes semi ligneuses (ronces).

**1-8 Répartition** : de la plaine à l'étage montagnard, espèce répandue.

## **2-OBSERVATIONS**

### **3-INTERÊT**

Sans intérêt.

### **4-RISQUES DE CONFUSION**

Avec *Marasmiellus vaillantii* (Pers.) Singer qui peut pousser dans les mêmes milieux ; il est en général plus élancé et son pied est plus pâle et moins poudreux.

**Vérfifié le 12 mars 2015**