

## LACTARIUS FLUENS

**Nom de référence** : *Lactarius fluens* Boud.

**Synonymes** : *Lactarius blennius* var. *fluens* (Boud.) Hrieglst.  
*Lactarius blennius* f. *albidopallens* J.E. Lange ex Bon

**Classification** : **Division** : Basidiomycota  
**Ordre** : Russulales  
**Famille** : Russulaceae

**Nom français** : lactaire coulant.

**Intérêt culinaire** : aucun.



Photo : René Chalange

## **1-DESCRIPTION**

- 1-1 Silhouette** : au sol, de dimension moyenne avec un pied central surmonté d'un chapeau plan-convexe puis à peine déprimé. Couleur dominante : gris olivâtre nuancé de brunâtre.
- 1-2 Chapeau** : de 4 à 12 cm, il est plan-convexe puis déprimé peu profondément. Le revêtement est visqueux et de couleur gris olivâtre à brun olivâtre ou ardoise, il est séparable sur 1/4 du rayon. Il est à un peu zoné et marqué de vagues cernes souvent diffus, parfois guttulé, il présente des veines radiales (loupe). La marge est unie ou courtement striée, incurvée, puis ondulée, elle est concolore au revêtement ou ocre pâle.
- 1-3 Pied ou stipe** : de 2-5 x 1-2 cm, il est très court (bien inférieur au diamètre du chapeau), central, cylindrique, atténué tout en bas. Sa surface est concolore au revêtement du chapeau ou plus pâle et localement lavée de rose. Elle n'est pas très visqueuse mais tout au plus lubrifiée ou sec.
- 1-4 Chair** : assez épaisse, ferme, elle est blanche mais plus foncée sous le revêtement du chapeau, elle vire très lentement au gris-verdâtre après la coupe. L'odeur est faible et agréable. Le latex est extrêmement abondant, il est âcre, blanc puis se décolore en gris-verdâtre en séchant.
- 1-5 Lames** : adnées à subdécurrentes à l'insertion sur le pied, elles sont serrées à espacées. Les lames sont crème-blanchâtre puis crème carné, elles se teintent très lentement de roux puis de brun dans les blessures. Les lamelles et lamellules sont nombreuses. L'arête est mince, entière, concolore à la face des lames dans la jeunesse, plus tard elle est liserée de brun olivâtre.
- 1-6 Sporée** : blanc crème un peu carné.
- 1-7 Habitat** : surtout sous les hêtres mais aussi les charmes et d'autres feuillus. En été et en automne.
- 1-8 Répartition** : espèce peu fréquente en plaine et en montagne. Elle vient généralement en groupe de quelques exemplaires.

## **2-OBSERVATIONS**

Les lactaires à lait blanc ne sont pas comestibles.

## **3-INTERÊT**

Aucun, espèce à rejeter.

## **4-RISQUES DE CONFUSION**

Avec tous les lactaires à latex blanc de même couleur, mais surtout avec *Lactarius blennius*.

Vérfié le 20 juin 2013